

reviderad 1992

88402

Fåglar i Fagersta 1960-1990

1. Storlom (*Gavia arctica*)

häckar regelbundet i de flesta större tjärnar och sjöar, tex Örtjärn, Ombenning Dammsjö, Märrsjön, Bredatjärn, Norr Morsjön, Onsjön, Dammen, Vevungen, Amänningen.

2. Smålom (*Gavia stellata*)

häckar årligen två tjärnar, Svarttjärn och Lindbackstjärn. Har även observerats i häckningstid i Bergtjärn, Gäddtjärn och Sävtjärn

3. Skäggdopping (*Podiceps cristatus*)

Häckar med ett 20-30tal par i Kolbäcksåns sjösystem, under 80-talet med tex ett 20-tal par i Brandboviken

4. Gråhakedopping (*Podiceps grisegna*)

två observationer: okt. 1968 i St. Aspen, maj 1988 med ett par vid Oljeön i Amänningen.

5. Svarthakedopping (*Podiceps auritus*)

häckar ej längre i kommunen, var under 60-talet och början av 70-talet häckfågel i Södra Morsjön med ett till två par. En sannolik häckning 1984 i Fågelmossen i Sundbo där ett par observerades i häckningstid. 1985 endast ett ex vid Fågelmossen

6. Häger (*Ardea cinerea*)

observeras årligen i flera ex. från vår till höst. Någon häckning ej konstaterad. Antalet observationer har ökat under 80-talet.

7. Storskarv (*Phalacrocorax carbo*)

en observation: april 1989 då ett ex sträckte över vid Backgården.

8. Knölsvan (*Cygnus olor*)

häckar med några få par i Kolbäcksåns sjösystem, under 80-talet i Vevungen, Brandbo viken och Sundbo. Enstaka ex. kan övervintra i tex Floboviken eller Sundbo.

9. Sångsvan (*Cygnus cygnus*)

allmän sträckfågel under april. Någon häckning i kommunen ej konstaterad, par har dock observerats i häckningstid.

10. Mindre sångsvan (*Cygnus columbianus*)

fyra observationer: 1 ex i april 1969 vid Backgården, 1 ex i april 1969 i Sundbo, 1 ex i april 1988 över Backgården, 1 ex 29 mars 1989 vid Back-

11. Kanadagås (*Branta canadensis*)

inkom i Fagerstas fauna under början av 60-talet och har därefter stadigt ökat. Häckar i de större sjöarna jämt i mindre skogstjärnar.

12. Prutgås (*Branta bernicla*)

tre observationer: sept 1982 i Vevungen, okt. 1982 i Hedtjärn, andra hälften av april 1986 i Kolbäcksåns sjösystem.

13. Vitkindad gås (*Branta leucopsis*)

en observation. ett ex i Hedtjärn maj 1982 (troligen förrymt ex)

14. Grågås (*Anser anser*)

observeras numera årligen i små flockar under vårsträck.

15. Bläsgås (*Anser albifrons*)

en observation: i april 1973

16. Sädgås (*Anser fabalis*)

regelbunden sträckfågel vår som höst

18. Gräsand (*Anas platyrhynchos*)

allmän häckfågel. Övervintrer med ca femtio par vid Kyrkbron, med 7-10 par i Sundbo, med 8-10 par i Semla.

19. Stjärtand (*Anas acuta*)

observeras tillfälligt under vårsträcket, dock med något ökad frekvens under andra hälften av 80-talet då den noterats årligen

20. Bläsand (*Anas penelope*)

årlig sträckfågel i mindre flockar, flest observationer under våren. Tillfälligt i större flockar som 1 maj 1977 med 75 ex vid Backgården och mer än 100 ex i maj 1985 i St. Aspen

21. Kricka (*Anas crecca*)

häckar fåtaligt i mindre tjärnar och myrgölar, uppskattningsvis 2-3 par årligen(?). Under vår och höst en allmän sträckfågel

22. Arta (*Anas querquedula*)

få noteringar under trettioårsperioden, en sällsynt förbisträckare. Ingen observation under 80-talet.

23. Skedand (*Anas clypeata*)

sällsynt förbisträckare under våren. Två noteringar under trettiosårsperioden, i maj 1965 och två ex i maj 1988 vid Backgården.

24. Gravand (*Tadorna tadorna*)

två observation: den 23 april 1986 i Stora Aspen då ett ex noterades och ett ex den 30 april 1988 i Vevungen

25. Bergand (*Aythya marila*)

sällsynt förbisträckare, tre noteringar under trettioårsperioden. Maj 1966 vid Backgården, 3 nov. 1985 med 1 ex i Flogen, april 1987 med två ex i St. Aspen.

26. Vigg (*Aythya fuligula*)

observeras årligen under vårsträcket men även under höststräck om än mindre regelbundet. Någon häckning är ej konstaterad.

27. Brunand (*Aythya ferina*)

observeras i stort sett årligen under våren i några få ex.

28. Vitögd dykand (*Aythya nyroca*)

en observation, den 7 april 1970 i Kratten, en hanindivid

29. Knipa (*Bucephala clangula*)

allmän häckfågel. Enstaka ex övervintrar som regel.

30. Alfågel (*Clangula hyemalis*)

sex fynd under trettioårsperioden 1960-90, senast i St. Aspen i maj 1985 med 2 ex.

31. Sjöorre (*Melanitta nigra*)

observeras årligen under sträck i enstaka flockar eller par

32. Svärta (*Melanitta fusca*)

två observationer, en honindivid den 7 febr. 1970 i Amärringen, 1 hanindivid i augusti 1988 som sträckte över Kulflyten.

33. Ejder (*Somateria mollissima*)

en observation, 2 ex vid Flohäll i Amärringen den 29 april 1978

34. Småskrake (*Mergus serrator*)

häckar med några enstaka par i Kolbäcksåns sjösystem, tex Amärringen och Saxen.

35. Storskrake (*Mergus merganser*)

uppskattningsvis häckar ett 5-10tal par i Kolbäcksåns sjösystem. Samlas i stora flockar under hösten i Stora Aspen och Brandboviken, som mest ca 300. Enstaka ex. kan övervintra

36. Salskrake (*Mergus albellus*)

enstaka observationer, ej årligen, men med ökad frekvens under andra hälften av 80-talet då den noterats årligen, dock ej 1989.

37. Kungsörn (*Aquila crysaetos*)

observeras årligen från okt-nov till febr-mars, i huvudsak vid utfodringsplatsen vid Kulflyten. Individantalet rör sig som mest om 10-15 ex under ett år.

38. Havsörn (*Haliaeetus albicilla*)

från och med den första observationen i dec. 1984 noteras nu havsörn i två till tre ex. årligen. I regel vårtid med sträckande fågel eller runt utfodringsplatsen vid Kulflyten

39. Ormvråk (*Buteo buteo*)

häckar ännu tämligen allmänt med ca 10-talet par i kommunen

40. Fjällvråk (*Buteo lagopus*)

rel. vanlig sträckfågel under vår och höst.

41. Bivråk (*Pernis apivorus*)

häckar med sannolikt ett-två par i kommunen. Sträcker över under vår och höst

42. Duvhök (*Accipiter gentilis*)

häckfågel men numerär okänd, sannolikt ett tio-tal par

43. Sparvhök (*Accipiter nisus*)

häckfågel men numerär oklar, sannolikt cirka 10-15 par

44. Glada (*Milvus milvus*)

två observationer: 15 april 1983 vid Backgården, 30 april 1988 vid Backgården.

45. Brun glada (*Milvus migrans*)

en observation: 26 april 1969 vid Avestbo ängar

46. Fiskgjuse (*Pandion haliaetus*)

har under den tidigare delen av trettioårsperioden 1960-1990 häckat med några få par i kommunen men har sannolikt under 80-talet utgått som häckfågel i kommunen.

47. Brun kärrhök (*Circus aeruginosus*)

har från mitten av 80-talet observerats årligen i några få exemplar under sträckperioden om våren. Ett ex. har även noterats i häckningstid vid Backgårdskärret.

48. Blå kärrhök (*Circus cyaneus*)

observeras som regel med flera ex. Årligen såväl vår som höst.

49. Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*)

noterades regelbundet under sträcktid i början av 60-talet för att därefter blir sällsynt sträckgäst. Senaste observationen var i slutet av april 1989 då ett ex sträckte över vid Backgården. Två andra noteringar är gjorda under 80-talet, 1ex i sep. vid Backgården och 1 ex i okt. vid Kyrkmossen

50. Lärfalk (*Falco subbuteo*)

häckar med sannolikt ett-två par inom kommunen

5150 Stenfalk (*Falco columbarus*)

observeras årligen under vår- och höststräck.

52. Tornfalk (*Falco tinnunculus*)

var i början av trettioårsperioden årlig häckfågel med ett till två par men har därefter häckat vid något enstaka tillfälle. Någon häckning är ej noterad under åttio-talet. Sträcker dock över med flera individer under framförallt våren.

53. Tjäder (*Tetrao urugallus*)

har under trettioårsperioden gått tillbaka i numerär. Inom kommunen är sex spelplatser kända med ca 3-10 spelande tuppar.

54. Orre (*Tetrao tetrix*)

tycks ha ökat i antalet under senare år. Någon större spelplats finns inte längre i kommunen sedan Kulflyten mer eller mindre övergivits. Huruvida spelplasten vid Flohällsmossen fortfarande används är oklart, under mitten av 60-talet fanns där 10-15 tuppar.

55. Järpe (*Bonasia bonasia*)

relativt allmän i lämpliga miljöer, dvs kärrmiljöer runt om i kommunen.

56. Rapphöna (*Perdix perdix*)

har inte sedan 60-talet observerats i kommunen då sju fynd noterats. Sista noteringen är gjord den 8 maj 1970 med 2 ex vid Backgården.

57. Vaktel (*Coturnix coturnix*)

en observation, 29 maj 1988 vid Avestbo ängar med ett spelande ex.

58. Fasan (*Phasianus colchicus*)

rel vanlig under sextiotalet men tycks därefter har gått ur faunan.

59. Trana (*Grus grus*)

häckar med uppskattningsvis 6-8 par i kommunen. Vanlig översträckare under vår och höst.

60. Vattenrall (*Rallus aquaticus*)

har noterats i ett fåtal exemplar i under första hälften av perioden 1960-1990, bl.a. med tre ex i juli 1975 vid Melingssjön. Under andra hälften inga observationer.

61. Småfläckig sumphöna (*Porzana porzana*)

en observation: i början av juni 1984 i Backgårdskärret

62. Kornknarr (*Crex crex*)

observeras sedan början av 80-talet mer eller mindre årligen i något exemplar, bla vid Avestbo ängar, Hedkärra och Ombenning

63. Rörhöna (*Gallinule chloropus*)

observerades fram till början av 80-talet årligen och dessutom förekom enstaka häckningar. Har därefter noterats betydligt mer sällan och är numera ej årlig i kommunen. Senast noterad i maj 1987 i St. Aspen.

64. Sothöna *Fulica atra*)

häckar tillfälligt i kommunen. Noteras framförallt under vårperioden då flera ex kan iaktas.

65. Strandskata (*Haematopus ostralegus*)

observeras tillfälligt i något ex. under vårsträck, ej årligen.

66. Tofsvipa (*Vanellus vanellus*)

har gått tillbaka kraftigt under trettioårsperioden och häckar numera men några enstaka par i kommunen

67. Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*)

observeras i enstaka ex under sträck, ej årlig

68. Mindre strandpipare (*Charadrius dubius*)

häckar på tre lokaler med ca 4-5 par totalt

69. Kustpipare (*Pluvialis squatarola*)

två observationer: (ej rapporterade), 30 april 1966 i Sundbo, 14 sept. 1975 i Sundbo.

70. Ljungpipare (*Pluvialis apricaria*)

häckar på Kulflyten med ett till två par årligen. Sträcker årligen med enstaka exemplar främst under våren.

71. Enkelbeckasin (*Gallinago gallinago*)

häckar rel. allmänt.

72. Dubbelbeckasin (*Gallinago media*)

tre observationer, (ej rapporterade): i maj 1969 vid Avestbo, i maj 1970 vid Svarberget och i maj 1971 vid Avestbo.

73. Dvärgbeckasin (*Gallinago minimus*)

en observation: (ej rapporterad) 8 maj 1970 i Avestbo

74. Morkulla (*Scolopax rusticola*)

häckfågel

75. Storspov (*Numenius arquata*)

häckar med ett fåtal par i kommunen, troligen runt fem par. Stark tillbakagång under trettioårsperioden. Sträckfågel vår, sommar och höst.

76. Småspov (*Numenius phaeopus*)

observeras sporadiskt under vårsträck, ej årligen. Få noteringar under 80-talet

77. Rödspov (*Limosa limosa*)

en observation; (ej rapporterad) 6 maj 1970 i ett ex vid Avestbo ängar

78. Drillsnäppa (*Actitis hypoleucus*)

allmän häckfågel vid de större sjöarna

79. Skogsnäppa (*Tringa ochropus*)

häckar täml. allmänt

80. Grönbena (*Tringa glareola*)

häckar fäťaligt på de större myrområdena, tex Kulflyten.

81. Rödbena (*Tringa totanus*)

observeras tillfälligt under sträck. Under 80-talet har arten noterats nästintill årligen i något eller några ex under vårperioden

82. Svartsnäppa (*Tringa erythropus*)

två observationer; i maj och aug. 1965. lokal okänd.

83. Gluttsnäppa (*Tringa nebularia*)

observeras årligen, i första hand under vårsträcket.

84. Brushane (*Philomachus pugnax*)

observeras sällsynt under sträck, ej årligen

85. Kustsnäppa (*Calidris canutus*)

observerad en gång: (ej rapporterad) den 11 sept. 1977 vid Onsjö

86. Kärrsnäppa (*Calidris alpina*)

sällsynt sträckfågel, tre observationer: två vårfynd vid Backgården och ett höstfynd vid Kulflyten. Inga noteringar under åttio-talet

87. Mosnäppa (*Calidris temminckii*)

en observation: maj 1983 vid sladammarna i Semla

88. Småsnäppa (*Calidris minuta*)

en observation: 8 sept. 1983 i Sundbo

89. Smalnäbbad simsnäppa (*Phalaropus lobatus*)

tre observationer: Gåslungen 11 aug. 1965, Saxen 18 sept. 1977 samt ett ett ex. i början av 70-talet på Kulflyten

90. Havstrut (*Larus marinus*)

från att ha observerats två gånger fram till 1983 har fyndantalet under andra hälften av 80-talet ökat och havstrut har noterats årligen i 1-3 ex, i första hand vårfynd.

91. Silltrut (*Larus fuscus*)

från mer sporadiska observationer under 60- och 70-talen har antal fynd under 80-talet ökat och silltrut är numera årlig, främst under våren men även sensommarfynd har gjorts. Antal per år varierar mellan 1-5 ex

92. Gråtrut (*Larus argentatus*)

häckar fåtaligt i Kolbäcksåns sjösystem. Övervintrar ej.

93. Fiskmås (*Larus canus*)

allmän häckfågel

94. Skrattmås (*Larus ridibundus*)

häckar i några små kolonier, tex Brandboviken. Vissa vårar har arten noterats i ca 2000-2500 individer vid islossningen på St. Aspen

95. Svarttärna (*Chlidonias niger*)

en observation: (ej rapporterad) i maj 1982 i Amänningen.

96. Skräntärna (*Sterna caspia*)

en observation: (ej rapporterad) tre ex 1973

97. Fisktärna (*Sterna hirundo*)

häckar rel sparsamt i Kolbäcksåns sjösystem

98. Silvertärna (*Sterna paradisea*)

observeras fåtaligt under sträck, ej årligen. (artbestämningsproblem?)

99. Skogsduva (*Columba oenas*)

häckar sannolikt med ett fåtal par. Antalet noteringar har ökat under åttio-talet, i första hand under vårperioden

100. Ringduva (*Columba palumbus*)

allmän häckfågel

101. Turturduva (*Streptopelia turtur*)

en observation, (ej rapporterad) juli 1972 i Floboområdet

102. Turkduva (*Streptopelia decaocto*)

observerades årligen under 70-talet för att under åttio-talet nästan helt försvinna.

103. Gök (*Coculus canorus*)

rel allmän häckfågel

104. Berguv (*Bubo bubo*)

första observationen vid Sämkossen 11 febr 1983, andra observationen i slutet av dec. 1989 vid Kulflyten.

105. Sparvuggla (*Glaucidium passerinum*)

förekommer fåtaligt som häckfågel

106. Pärluggla (*Aegolius funereus*)

häckar sparsamt i kommunen.

107. Slaguggla (*Strix uralensis*)

enstaka observationer, ej årlig. Häckning inte konstaterad.

108. Kattuggla (*Strix aluco*)

häckar sparsamt i kommunen

109. Hornuggla (*Asio otus*)

häckar sparsamt i kommunen

110. Jorduggla (*Asio flammeus*)

observeras sällsynt under sträck, ej årlig

111. Hökuggla (*Surnia ulula*)

observeras ej årsvisst men dock med ökad frekvens under 80-talet. Stor invasion hösten och vintern 1983-84 som även ledde fram till några häckningar sommaren 1984. Även hösten och vintern 1989-90 har varit en mindre invasionsår.

112. Nattskärra (*Caprimulgus europeus*)

häckar sparsamt i kommunen, tex efter Färnaåsen

113. Tornseglare (*Apus apus*)

allmän häckfågel

114. Kungsfiskare (*Alcedo atthis*)

sex observationer under trettioårsperioden, samtliga under 60- och 70-talen, senast våren 1977, Samtliga fynd är gjorda i Semlaområdet.

115. Härfågel (*Upupa epops*)

tre observationer: aug 1969 i Semla, okt. 1983 i Avestbo, maj 1985 i "Nords hästhage"

116. Gröngöling (*Picus viridis*)

täml. allmän häckfågel

117. Gråspett (*Picus canus*)

har under 80-talet observerats nära nog årligen i enstaka ex. Under hela vintern 87/88 uppehöll sig ett par i Norr Morsjön. Sannolikt men ej konstaterat häckar något par i kommunen

118. Större hackspett (*Dendrocopos major*)

allmän häckfågel

119. Mindre hackspett (*Dendrocopos minor*)

häckar fäťaligt, 5-6 par i kommunen. Stammens status har varit stabil under 80-talet

120. Vitryggig hackspett (*Dendrocopos leucotos*)

sista observationen är gjord i dec 1988, därefter har arten inte noterats i kommunen. Tidigare har ett par häckat stadigt i Semlaområdet under trettioårsperioden. Har även häckat i Sundbo 1966. Arten har även under 80-talet noterats i Ängelsberg och Björsbo-Saxens sydspets, dock enbart en honindivid.

121. Tretåig hackspett (*Picoides tridactylus*)

har gått tillbaka under trettioårsperioden från att tidigare ha observaretas årligen till att nu under åttiotalet ha noterats någon enstaka gång. Lokaler under 80-talet har varit Saxberget, Rudgruvan, Högbyn, Meling, Grillsjöbäcken och Skröparberget.

122. Göktyta (*Jynx torquilla*)

rel allmän häckfågel)

123. Spillkråka (*Dryocopus martius*)

häckar rel. allmänt och numerären tycks ha varit stabil under perioden.

124. Sånglärka (*Alauda arvensis*)

rel vanlig häckfågel som dock har minskat under perioden i antal

125. Trädlärka (*Lullula arborea*)

sällsynt påträffad under trettioårsperioden. Under den första hälften av 80-talet fanns några enstaka fåglar runt Kulflyten-Kulheden där de sannolikt häckade. Numera har inga observationer noterats från området

126. Berglärka (*Eremophila alpestris*)

två observationer: 28 april 1966 vid Backgården, 1-2 nov 1970 vid reningsverket

127. Backsvala (*Riparia riparia*)

häckar på två till tre ställen utefter Färnaåsen i kolonier om 10-15 par

128. Ladusvala (*Hirunda rustica*)

rel. vanlig häckfågel som sannolikt minskat något i brist på lämplig häckningsmiljö

129. Hussvala (*Delichon urbica*)

rel. allmän häckningsfågel

130. Trädpiplärka (*Anthus trivialis*)

allmän häckfågel

131. Ängspiplärka (*Anthus pratensis*)

häckar med några enstaka par på de största mossarna, tex. Kulflyten. Mycket vanlig sträckfågel vår och höst

132. Rödstrupig piplärka (*Anthus cervinus*)

sällsynt förbisträckare vår och höst. Har noterats såväl våren 1988 som hösten 1989 i enstaka ex.

133. Gulärla (*Motacilla flava*)

rasen *thunbergii* sträcker årligen vår och i mindre utsträckning höst. rasen *flava* har observerats i häckningstid vid enstaka tillfällen bla på Kulflyten och Morbymossen.

134. Forsärla (*Motacilla cinerea*)

enstaka observationer från april till maj samt aug-sept i Semla Åren 1968, 1969, 1971, 1984, 1986, 1988, 1989. Häckning ej konstaterad

135. Sädesärla (*Motacilla alba*)

allmän häckfågel

rasen *yarelli* häckade med en hanindivid 1977 vid Rudgruvan

136. Törnskata (*Lanius colluria*)

rel allmän häckfågel, har sannolikt ökat i antal med hyggesbruket

137. Varfågel (*Lanius excubitor*)

observeras årligen under sträck vår och höst. Enstaka ex. håller vinterrevir i kommunen. Arten har noterats under häckningstid med någon konstaterad häckning har inte gjorts.

138. Stare (*Sturnus vulgaris*)

rel allmän häckfågel som dock minskat under 80-talet

139. Sidensvans (*Bombycilla garullus*)

Årlig invasionsgäst från som regel okt-april. Fynd från maj och aug/sept förekommer.

140. Nötskrika (*garullus glandarius*)

allmän häckfågel

141. Skata (*Pica pica*)

allmän häckfågel som under trettioårsperioden alltmer koloniserat kommunens villaområden

142. Nötkråka (*Nucifraga caryocatactes*)

observeras i enstaka ex, i allmänhet årligen med de flesta fynden under hösten. Flest fynd i Högbyn där sannolikt arten även kan tänkas häcka

143. Kaja (*Corvus monedula*)

allmän häckfågel

144. Råka (*Corvus frugilegus*)

Årlig förbisträckare i mars-april, mer sällan höst.

145. Kråka (*Corvus corone cornix*)

allmän häckfågel

146. Korp (*Corvus corax*)

återkom till bygden i mitten av 60-talet för att därefter ha etablerat sig som häckfågel och kraftigt ökat i antal. Tillkomsten av åtlar under vinterhalvåret drar till sig hundratals korp.

147 Strömstare (*Cinclus cinclus*)

observeras årligen i Kolbäcksån strömmande vatten från okt-april, mest talrikt i Semla och Snytenbäcken. Häckar tillfälligt med något par dock ej årligen, senast i Semla 1988.

148. Gårdsmyg (*Troglodytes troglodytes*)

häckar sparsamt i lämplig miljö, tex Trummelsberg

150. Järnspurv (*Prunella modularis*)

rel. allmän häckfågel. Vanlig sträckfågel vår och höst

151. Flodsångare (*Locustella fluviatilis*)

tre observationer: juni-63 vid Melingssjön, juni-71 vid Hedtjärn, juni -83 vid Eriksbo i Bastmora

152. Gräshoppsångare (*Locustella naevia*)

observeras numera årligen sedan 70-talet i några exemplar, i regel vid Backgården och Avestbo ängar. Sannolikt häckar även arten.

153. Sävsångare (*Acrocephalus schoenobaenus*)

häckar sparsamt och mindre talrikt än tidigare

154. Rörsångare (*Acrocephalus scirpaceus*)

häckar rel allmänt, har ökat i antal under trettioårsperioden.

55 Kärrsångare (*Acrocephalus palustris*)

en art stadd i ökning, före 80-talet endast två fynd, under 80-talet årlig i ett till två ex. I regel vid Backgården och Avestbo ängar

56 Gulsångare (*Hippolais icterina*)

tycks ha ökat något under 80-talet och sjungande fåglar hörs på flera lokaler under häckningssäsongen.

157. Trädgårdssångare (*Sylvia borin*)

allmän häckfågel

158. Svarthätta (*Sylvia atricapilla*)

allmän häckfågel som tycks ha ökat under 80-talet

159. Törnsångare (*Sylvia communis*)

häckar sparsamt med några par, har minskat under trettioårsperioden.

160. Ärtsångare (*Sylvia curruca*)
rel vanlig häckfågel
161. Lövsångare (*Phylloscopus trochilus*)
allmän häckfågel
162. Gransångare (*Phylloscopus collybita*)
Årlig förbisträckare vår och höst. Häckning konstaterad 1971, 1972. Sjungande hanar har observerats under häckningstid 1988 och 1989. Kan arten etablera sig som årlig häckare under 90-talet?
163. Grönsångare (*Phylloscopus sibilatrix*)
rel vanlig häckfågel
164. Kungsfågel (*Regulus regulus*)
allmän häckfågel
165. Svartvit flugsnappare (*Ficedula hypoleuca*)
allmän häckfågel
166. Mindre flugsnappare (*Ficedula parva*)
observeras ej årligen. Sammanlagt har arten observerats ett 20-tal ggr under trettioårsperioden, ibland med fler ex under samma år som tex 1988 då tre ex noterades. Häckning konstaterad 1973. Första fyndet gjort den 5 maj 1969 vid Svartherget.
167. Grå flugsnappare (*Muscicapa striata*)
allmän häckfågel
168. Stenskvätta (*Oenanthe oenanthe*)
arten har kraftigt minskat under trettioårsperioden och häckar nu yttersparsamt
169. Buskskvätta (*Saxicola rubetra*)
allmän häckfågel
170. Rödstjärt (*Phoenicurus phoenicurus*)
arten har gått tillbaka under trettioårsperioden, har under 80-talet i viss utsträckning etablerat sig som häckningsfågel i villaområdena.
171. Svart rödstjärt (*Phoenicurus ochrorus*)
arten har noterats i regel årligen inom bruksområdet där den även konstaterats ha häckat. Första fyndet den 7 juni 1972. I regel har en hane hörts sjunga, en gång 2 hanar (1988)

172. 180. Rödhake (*Erithacus rubecula*)

• allmän häckfågel

173. Blåhake (*Luscinia svecica*)

Årlig förbisträckare under hösten, även enstaka vårnötingar finns

174. Nåktergal (*Luscinia luscinia*)

observeras numera årligen från att under 60-och 70talen varit en exklusiv art. Vissa år förekommer den i större antal än brukligt som 1984 då 10 hanar sjöng. Det normala antalet ligger runt 2-4 hanar. Häckning är inte konstaterad men får bedömas som trolig

175. Ringtrast (*Turdus torquatus*)

sträcker fataligt förbi under våren. Observeras ej årligen, dock har arten noterats årligen under de sista åren av Åttio-talet

176. Koltrast (*Turdus merula*)

allmän häckfågel, enstaka ex. övervintrar

177. Rödvingetrast (*Turdus iliacus*)

allmän häckfågel

178. Dubbeltrast (*Turdus viscivorus*)

mindre allmän häckfågel

179. Taltrast (*Turdus philomelos*)

allmän häckfågel

180. Björktrast (*Turdus pilaris*)

allmän häckfågel, enstaka ex övervintrar, någon gång större flockar

181. Entita (*Parus palustris*)

allmän häckfågel

182. Talltita (*Parus montanus*)

allmän häckfågel

183. Tofsmes (*Parus cristatus*)

rel allmän häckfågel

184. Blåmes (Parus caeruleus)
allmän häckfågel
185. Svartmes (parus ater)
allmän häckfågel
186. Talgoxe (Parus major)
allmän häckfågel
187. Lappmes (Parus cinctus)
tre observationer: jan. 1980 vid Sämkmossen, dec. 1985 i Semla, jan. 86
i Semla (troligen samma individ i Semla)
188. Stjärtmes (Aegithalos caudatus)
häckar sparsamt. Observeras mest vintertid i flockar på 10-15 individer
189. Nötväcka (Sitta europaea)
täml allmän häckfågel
190. Trädkrypare (Certhia familiaris)
rel allmän häckfågel
191. Gråsparv (Passer domesticus)
rel allmän häckfågel, har gått tillbaka under trettioårsperioden
192. Pilfink (Passer montanus)
allmän häckfågel, har kraftigt ökat i antal under trettioårsperioden
193. Bofink (fringilla coelebs)
allmän häckfågel, enstala ex kan övervintra
194. Bergfink (Fringilla montifringilla)
talrik förbisträckare vår och höst, enstaka ex kan övervintra. Häckning
har kontaterats 1982 men tex 1988 hördes fler sjungande hanar under
häckningssäsongen så sannolikt häckar enstaka ex årligen
195. Domherre (Pyrrhula pyrrhula)
tämligen allmän häckfågel
196. Stenkäck (Coccothraustes coccothraustes)
har under 80-talet observerats nära nog årligen, främst under vinter-
halväret. Även enstaka observationen under häckningstid. Häckning
konstaterad 1981 på "Andra sidan". 19 individer noterades i en flock
dec. 1985-febr. 1986 i Semlaområdet

197. Grönfink (*Carduelis chloris*)

allmän häckfågel

198. Grönsiska (*Carduelis spinus*)

allmän häckfågel

199. Steglits (*Carduelis carduelis*)

observeras tillfälligt och ej årligen, de senaste noteringarna har gjorts under dec-jan.

200. Hämpling (*Carduelis canubina*)

arten har minskat kraftigt under trettioårsperioden och har sannolikt gått ur faunan som häckfågel. Enstaka ex. noteras under sträcktid

201. Vinterhämpling (*Carduelis flavirostris*)

var tidigare ej årsvis men har under senare delen av 80-talet noterats årligen under vår- och/eller höststräck

202. Gråsiska (*Carduelis flammea*)

strykfågel under vinterhalvåret, observeras då regelbundet

203. Snösiska (*Carduelis hornemanni*)

observeras vid enstaka tillfällen under vinterhalvåret, ej årligen. 1985 noterades arten vid flera tillfällen. Första noteringen i sept. 1965

204. Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*)

invandrade under slutet av 60-talet och har sedan dess etablerat en fast stam på ca 10-15 sjungande hanar

205. Tallbit (*Pinicola enucleator*)

observeras som regel årsvisst i enstaka ex. Vissa år uppträder arten mer invasionsmässigt och ses då i större flockar, tex 1989

206. Mindre korsnäbb (*Loxia curvirostra*)

allmän häckfågel

207. Större korsnäbb (*Loxia pytyosittacus*)

häckar sannolikt fåtaligt, artens numerär mycket oklar

208. Bändelkorsnäbb (*Loxia leucoptera*)
två observationer; vintern 77/78 och i okt. 1982 vid Skeppmora
209. Kornsparv (*Miliaria calandra*)
en observation: 4 maj 1967 i Sundbo
210. Videsparv (*Emberiza rustica*)
har under trettioårsperioden observerats vid fem tillfällen, fyra fynd i april/maj, ett fynd i september. Senast i april 1987 i Sundbo. Vid två tillfällen i april noterades ett par vid Svartberget, varför häckning inte kan uteslutas.
211. Ortolansparv (*Emberiza hortulana*)
Observeras numera årligen under vårsträcket i några få exemplar.
Häckning ännu ej konstaterad
212. Sävsparv (*Emberiza schoeniclus*)
allmän häckfågel, enstaka vinterobservationer
213. Gulsparv (*Emberiza citrinella*)
allmän häckfågel
214. Lappsparv (*Calcarius lapponicus*)
observeras årligen i enstaka ex. under främst vårsträcket
215. Snösparv (*Plectrophenax nivalis*)
observeras årligen under våren i mindre flockar