

## Fåglar i Lundby socken åren 1945—53.

Lundby socken är belägen utanför Västerås stad. Naturen består av blandskogar, åkrar, ängar och ett fåtal kärrmarker. Arealen är ca 1 300 ha. Under de år som undertecknad haft fågellivet under observation har sextio arter häckat, medan en troligen häckat och sju varit tillfälligt häckande.

I nedanstående förteckning har följande förkortningar använts: h = häckande, h? = troligen häckande, ht = tillfälligt häckande, b = besöker regelbundet trakten, bt = besöker tillfälligt trakten (även fåglar på genomflyttning).

- Kräka (*Corvus corone*), h, allmän.  
 Kaja (*Corvus monedula*), h, allmän.  
 Skata (*Pica pica*), h, allmän.  
 Nötkräka (*Nucifraga caryocatactes*), bt.  
 Nötskrika (*Garrulus glandarius*), h, allmän.  
 Stare (*Sturnus vulgaris*), h, allmän, ankomsttid 20—25 mars.  
 Stenknäck (*Coccothraustes coccothraustes*), bt (1950).  
 Grönfink (*Chloris chloris*), h, allmän.  
 Steglits (*Carduelis carduelis*), ht.  
 Grönsiska (*Carduelis spinus*), h, allmän.  
 Hämpling (*Carduelis cannabina*), h, mindre allmän.  
 Domherre (*Pyrrhula pyrrhula*), h, mindre allmän.  
 Tallbit (*Pinicola enucleator*), bt.  
 Mindre korsnäbb (*Loxia curvirostra*), bt.  
 Större korsnäbb (*Loxia pytyopsittacus*), bt.  
 Bofink (*Fringilla coelebs*), h, allmän, medelankomst 28.3.  
 Bergfink (*Fringilla montifringilla*), bt.  
 Gulspurv (*Emberiza citrinella*), h, allmän.  
 Ortolansparv (*Emberiza hortulana*), h, mindre allmän.  
 Sävsparv (*Emberiza schoeniclus*), bt.  
 Snöspurv (*Plectrophenax nivalis*), bt.  
 Gråspurv (*Passer domesticus*), h, allmän.  
 Pilfink (*Passer montanus*), h, allmän.  
 Trädlärka (*Lullula arborea*), h, allmän.  
 Sånglärka (*Alauda arvensis*), h, allmän.  
 Trädpiplärka (*Anthus trivialis*), h, mindre allmän.  
 Gulärta (*Motacilla flava*), bt, hösten 1951 särskilt allmän.  
 Sädesärta (*Motacilla alba*), h, allmän.  
 Trädkrypare (*Certhia familiaris*), h, mindre allmän.  
 Nötväcka (*Sitta europaea*), h, allmän.  
 Talgoxe (*Parus major*), h, allmän.  
 Svartmes (*Parus ater*), h, mindre allmän.  
 Blåmes (*Parus caeruleus*), h, allmän.  
 Tofsmes (*Parus cristatus*), h, allmän.

Entita ( )  
 Talltita  
 Stjärtme  
 Varfåge  
 Törnska  
 Sidensva  
 Grå flug  
 Svart-vi  
 komst 12.4  
 Kungsfå  
 Gransån;  
 Lövsång;  
 Grönsån;  
 Sävsånga  
 Trädgård  
 Svarthät  
 Törnsång  
 Ärtsånga  
 Björktras  
 Dubbeltr  
 Koltrast  
 Taltrast  
 Rödvinge  
 Stenskvät  
 Buskskvä  
 Rödstjärt  
 Rödhake  
 Järnsparv  
 Gärdsmys  
 Ladusvala  
 Hussvala  
 Tornsvala  
 Nattskärr  
 Gröngölin  
 Större hac  
 Mindre ha  
 Vitryggig  
 Tretåig ha  
 Spillkräka  
 Göktyta ( )  
 Gök (Cuc  
 Sparvuggla  
 Hornuggla  
 Kattuggla  
 Lärkfalk ( )  
 Stenfalk ( )

- Entita (*Parus palustris*), h, allmän.  
 Talltita (*Parus atricapillus*), h, allmän.  
 Stjärtmes (*Aegithalos caudatus*), h, allmän.  
 Varfågel (*Lanius excubitor*), bt.  
 Törnskata (*Lanius collurio*), h, mindre allmän.  
 Sidensvans (*Bombycilla garrulus*), bt.  
 Grå flugsnappare (*Muscicapa striata*), h, allmän.  
 Svart-vit flugsnappare (*Muscicapa hypoleuca*), h, allmän, medelan-  
 komst 12.4.  
 Kungsfågel (*Regulus regulus*), h, allmän.  
 Gransångare (*Phylloscopus collybita abietinus*), bt.  
 Lövsångare (*Phylloscopus trochilus*), h, allmän.  
 Grönsångare (*Phylloscopus sibilatrix*), h, mindre allmän.  
 Sävsångare (*Acrocephalus schoenobaenus*), h?  
 Trädgårdssångare (*Sylvia borin*), h, allmän.  
 Svarthätta (*Sylvia atricapilla*), h, mindre allmän.  
 Törnsångare (*Sylvia communis*), h, allmän.  
 Ärtsångare (*Sylvia curruca*), h, allmän.  
 Björktrast (*Turdus pilaris*), h, allmän.  
 Dubbeltrast (*Turdus viscivorus*), h, 1947, 1949.  
 Koltrast (*Turdus merula*), h, allmän.  
 Taltrast (*Turdus ericetorum philomelos*), h, allmän.  
 Rödvingetrast (*Turdus musicus*), bt.  
 Stenskvätta (*Oenanthe oenanthe*), h, allmän.  
 Buskskvätta (*Saxicola rubetra*), h, allmän.  
 Rödstjärt (*Phoenicurus phoenicurus*), h, allmän.  
 Rödhake (*Eritbacus rubecula*), h, allmän.  
 Järnsparv (*Prunella modularis*), h, 1951.  
 Gärdsmyg (*Troglodytes troglodytes*), bt.  
 Ladusvala (*Hirundo rustica*), h, mindre allmän.  
 Hussvala (*Delichon urbica*), h, mindre allmän.  
 Tornsvala (*Apus apus*), h, allmän.  
 Nattskärra (*Caprimulgus europaeus*), ht.  
 Gröngöling (*Picus viridis*), h, allmän.  
 Större hackspett (*Dendrocoptes major*), h, mindre allmän.  
 Mindre hackspett (*Dendrocoptes minor*), ht.  
 Vitryggig hackspett (*Dendrocoptes leucotos*), bt.  
 Tretåig hackspett (*Picoides tridactylus*), bt.  
 Spillkråka (*Dryocopus martius*), h, allmän.  
 Göktyta (*Jynx torquilla*), h, allmän.  
 Gök (*Cuculus canorus*), h, allmän.  
 Sparvuggla (*Glaucidium passerinum*), bt.  
 Hornuggla (*Asio otus*), ht.  
 Kattuggla (*Strix aluco*), h, allmän.  
 Lärkfalk (*Falco subbuteo*), bt.  
 Stenfalk (*Falco columbarius*), bt.

Tornfalk (*Falco tinnunculus*), h, mindre allmän.  
 Kungsörn (*Aquila chrysaetos*), bt.  
 Blå kärrhök (*Circus cyaneus*), bt.  
 Duvhök (*Accipiter gentilis*), ht.  
 Sparvhök (*Accipiter nisus*), h, mindre allmän.  
 Ormvråk (*Buteo buteo*), h, mindre allmän.  
 Bivråk (*Pernis apivorus*), ht.  
 Sångsvan (*Cygnus cygnus*), bt.  
 Knölsvan (*Cygnus olor*), bt.  
 Sädgås (*Anser fabalis*), bt.  
 Gräsand (*Anas platyrhynchos*), ht.  
 Ringduva (*Columba palumbus*), h, allmän.  
 Skogsduva (*Columba oenas*), h, allmän.  
 Storspov (*Numenius arquata*), h, allmän.  
 Morkulla (*Scopolax rusticola*), ht.  
 Gluttsnäppa (*Tringa nebularia*), bt.  
 Tofsvipa (*Vanellus vanellus*), ht.  
 Trana (*Grus grus*), bt.  
 Skrattnäs (*Larus ridibundus*), b.  
 Fiskmås (*Larus canus*), b.  
 Gråtrut (*Larus argentatus*), b.  
 Tjäder (*Tetrao urogallus*), ht.  
 Orre (*Lyrurus tetrix*), iakttagen hösten 1947.  
 Fasan (*Phasianus colchicus*), h, allmän.  
 Rapphöna (*Perdix perdix*), h, mindre allmän.

Västerås den 1.2. 1954.

Sven-Olof Andersson.

**Vinterfynd av rördrom.** Den 12 februari 1954 fann jag i vasskanten mot en äng ovanför »Beijershamnsbron», ungefär en halv mil söder om Färjestaden (på Öland) en, efter vad man kunde se, nyligen död rördrom (*Botaurus stellaris*). Den verkade först alldeles oskadad men befanns sedan i buken ha ett femöresstort, blodigt hål och var tämligen utsugen. För övrigt var den alldeles avmagrad, och måhända hade den, sedan kraftlöshet inträtt, fallit offer för något skadedjur.

Jag vet mig inte ha hört att rördrommar nyligen funnits här på orten, men antagligt är ju i alla fall att den funna fågeln varit kvar i denna typiska häckningsplats och av den ovanligt milda hösten och förvintern lurats övervintra. Efter jul har temperaturen mestadels varit omkr.  $-7^{\circ}$ , och tidigt på året var det barfrost. Nu fanns det ganska mycket snö, och vassen var delvis nervräkt av stormen; alla fåglar var borta.

Vickleby den 23.2. 1954.

Per-Erik Karlsson.

De vita till arealen alla födda ken. Det ä insprängda å avtryckt älgar — ko nas emeller tionden ut säga, att d lit sig inom å vilka iak blivit gjor berott på det, dock

En vädjan skapliga Fe att skona kan, men framgår av

Det torde — till det vita till vä nolikhet v som varje torde år 1 färgen och tande kava anlag, som palmat ho