

88162



Fåglar  
i  
Fagersta 1960-1985

Denna artlista tar upp observerade jämte häckande fågelarter i Fagersta kommun under en tidsperiod från 1960-talets början till dags dato årsskiftet 1984/85. Sammanställningen är den tredje som görs men den första som enbart begränsar sig till Fagersta kommun. De två tidigare sammanställningarna redigerade av Per Ålind, den första, och Jan Hellström, den andra, tar även in områden i grannkommunerna.

Syftet med denna artlista har varit att få en klar överblick över framförallt häckfågelfaunan i Fagersta. Genomgången av antalet häckande fåglar visar att kommunen under den aktuella tidsperioden har 105 årligen häckande arter och 17 arter som häckar mer sporadiskt. Vidare framgår att några arters häckningsstatus är mycket litet känd, det gäller framförallt rovfåglarna. Hur pass vanliga är de båda hökarterna? Några arter har gått tillbaka kraftigt under perioden som t.ex. tornfalk, tofsvipa, storspov, fisktärna, skogsduva, mindre hackspett och tretåig hackspett, sävsångare, stenskvätta, rödstjärt och hämplingen. Orsakerna till nedgången varierar från art till art men ofta är kraftiga förändringar i miljön en betydelsefull faktor i sammanhanget. Här har ornitologin en viktig uppgift att fylla då fågelarters beståndsvariationer är goda mätare på hur det står till med miljön.

Fagersta kommun är som helhet sett grovinventerad genom den s.k. "Atlasinventeringen" men en hel del återstår i inventeringsarbete av mer kvalitativ art, i synnerhet i kommunens södra och östra delar.

En artsammanställning som denna bygger på aktiva ornitologers arbete och kunnande och det är min förhoppning att detta engagemang skall kunna breddas och fördjupas för att kunskapen om vår kommunens fågelfauna skall öka och därmed vår möjlighet att aktivt arbeta för ett ändamålsenligt naturskydd.

Fagersta 27 dec. 1984  
Leif Lejdelin  
Fagersta ornitologiska förening

Storlom (Gavia arctica)

häckar regelbundet i de flesta större sjöar och tjärnar

Smålom (Gavia stellata)

har konstaterats häckande regelbundet i två mindre tjärnar, kan eventuellt även förekomma i någon tjärn till. Fiskar regelbundet i Aspensjöarna och Åmänningen

Skäggdopping (Podiceps cristatus)

häckar med åtskilliga par i Kolbäcksåns sjösystem. Har märkbart ökat under senare år.

Svarthakedopping (Podiceps auritus)

häckar sporadiskt i kommunen. Tidigare observerad årligen i Sör-Morsjön, nu sannolikt där utgången. En ny häckningslokal konstaterad 1984 vid Fågelmossen nordost Sundbo.

Gråhakedopping (Podiceps grisegena)

en observation vid Västanfors båtbryggor, St. Aspem okt. 1968

Häger (Ardea cinerea)

ingen häckning konstaterad. Observeras årligen, mest frekvent sensommar och höst då ungfåglarna lämnat boplatserna och söker födoområden.

Knölsvan (Cygnus olor)

häckar med några par i Kolbäcksåns sjösystem. Enstaka exemplar kan övervintra, oftast i Sundbo

Sångsvan (Cygnus cygnus)

häckning ännu inte konstaterad i kommunen. Par dock observerat i lämplig lokal i maj. Sträcker ganska ofta över Fagersta vår och höst och landar även ofta i bl.a. Aspensjöarna

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)

en observation, i Sundbo 27 april 1968 då fem ex. rastade.

Kanadagås (Branta canadensis)

en nykomling i faunan som kommit under sextio-talet som sedan tillväxt kraftigt. Häckar numera i större sjöar och tjärnar med enstaka par.

Prutgås (Branta bernicla)

en observation 1982 vid golfbanan i Hedkärra

Vitkindad gås (Branta leucopsis)

en observation i Hedtjärn maj 1982, troligen förrymt exemplar

Grågås (Anser anser)

observeras vid enstaka tillfällen under sträck vår och höst

Bläsgås (Anser albifrons)

en observation 1 april 1973 (troligen något förbisedd art)

Sädgås (Anser fabalis)

sträcker regelbundet vår och höst

Fjällgås (Anser erythropus)

en observation, sept. 1964 vid Melingssjön

Gräsand (Anas platyrhynchos)

allmän häckfågel. Övervintrar vid kyrkbron med ca 75-100ex och i Sundbo ström med ca. 15-20 ex

Stjärtand (Anas acuta)

observeras enstaka tillfällen under sträcktiden. Ej årlig.

Bläsand (Anas penelope)

observeras årligen i få exemplar under vår- och höststräck, ofta i St. Aspen

Kricka (Anas crecca)

vanlig sträckfågel vår och höst. Häckar fåtaligt i småtjärnar och myr-gölar.

Årta (Anas querquedula)

observeras vid enstaka tillfällen under sträcktiden. Ej årlig

Skedand (Anas clypeata)

observeras vid enstaka tillfällen under sträck. Ej årlig

Bergand (Aythya marila)

observeras vid enstaka tillfällen under sträck, Ej årlig

Vigg (Aythya fuligula)

observeras årligen under vår- och höststräck, ofta i St. Aspen. Häckning hittills ej konstaterad.

Brunand (Aythya ferina)

observeras årligen under i synnerhet vårsträck, ofta i St. Aspen

Vitögd dykand (Aythya nyroca)

en observation, den 7 april 1970 i Kratten

Knipa (Bucephala clangula)

allmän häckfågel. Övervintrar sällsynt.

Alfågel (Clangula hyemalis)

enstaka observationer vintertid, ej årlig. Observerad vid bl.a. Kratten och Semla.

Sjöorre (Melanitta nigra)

observeras årligen under sträck i enstaka exemplar.

Småskrake (Mergus serrator)

häckar med några få par i Kolbäcksåns sjösystem (Saxen, Åmänningen)

Storskrake (Mergus merganser)

ett tiotal par häckar i Kolbäcksåns vattensystem

Salskrake (Mergus albellus)

observeras enstaka tillfällen under sträck, i synnerhet vårsträck. Ej årlig

Kungsörn (Aquila crysaetos)

observeras vintertid årligen i få exemplar

Ormvråk (Buteo buteo)

häckar täml. allmänt. Totala antalet par är ej inventerat men rör sig sannolikt om 10-20 par

Fjällvråk (Buteo lagopus)

observeras årligen under vår- och höststräck.

Bivråk (Pernis apivorus)

häckar med några få par, totala antalet okänt

Duvhök (Accipiter gentilis)

häckfågel men antalet par okänt

Sparvhök (Accipiter nisus)

häckfågel men antalet par okänt

Havsörn (Haliaeetus albicilla)

observerad vid ett tillfälle, dec. 1984 i Bastmora

Glada (Milvus milvus)

oberverad vid ett tillfälle, den 15 april 1984 vid Backgården och Åvestbo  
Brun glada (Milvus migrans)

två observationer. 26 april 1969 vid Åvestbo ängar, 25 april 1982 på  
Kulflyten. (Observerad i Larsbo 22 april 1983)

Fiskgjuse (Pandion haliaetus)

W-län!

häckar med ett känt par i kommunen.

Brun kärrhök (Circus aeruginosus)

enstaka observationer under vårsträck, ej årlig

Blå kärrhök (Circus cyaneus)

observeras årligen under såväl vår- som höststräck i flertal exemplar.  
(häckade 1982 i Tolfsbo, Söderbärke)

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)

W-län!

observerad ytterst sporadiskt under vår- och höststräck

Lärfalk (Falco subbuteo)

häckar med ett fåtal par, sannolikt 2-3 par

Stenfalk (Falco columbarius)

observeras årligen under vår- och höststräck

Tornfalk (Falco tinnunculus)

har häckat ett fåtal gånger under senare tid, bl.a. i Hedkärra

Tjäder (Tetrao urugallus)

har under senare år gått tillbaka. Cirka fem spelplatser är kända.

Orre (Tetrao tetrix)

beståndets status oklart, någon större spelplats saknas i kommunen.

Järpe (Bonasa bonasia)

häckar fåtaligt men spritt i lämplig miljö över hela kommunen.

Rapphöna (Perdix perdix)

observeras ytterligt sporadiskt, bl.a. vid Backgården

Fasan (Phasianus colchicus)

numera sällsynt, ej årlig. Trots utgången ur kommunens fauna.

Trana (Grus grus)

häckar med 6-7 par (kan vara fler).

Vattenrall (Rallus aquaticus)

observerats i enstaka exemplar. Ej årligen. Noterbart: 3 ex. vid Melings-  
sjön i mitten av juli 1975. Häckning hittills ej konstaterad

Småfläckig sumphöna (Porzana porzana)

två observationer, 15 juli 1975 vid Melingssjön, början av juni 1984 vid Backgården

Kornknarr (Crex crex)

observeras i något enstaka exemplar årligen, bl.a. vid Backgården och Hedkärra

Rörhöna (Gallinula chloropus)

observeras årligen, häckar tillfälligt, bl.a. i Melingssjön och Lillån i Semla.

Sothöna (Fulica atra)

observeras årligen under sträck där flockar uppmot tjugo-trettio individer under våren kan uppehålla sig en längre tid i St. Aspen. Häckar tillfälligt i bl.a. St. Aspen och Melingssjön

Strandskata (Haematopus ostralegus)

observeras mycket tillfälligt under sträck, Ej årlig

Tofsvipa (Vanellus vanellus)

häckar täml. fåtaligt, har gått tillbaks under senare tid. Viss återhämtning under 1984.

Större strandpipare (Charadrius hiaticula)

observeras i enstaka exemplar under sträck. Ej årlig

Mindre strandpipare (Charadrius dubius)

häckar på tre lokaler med sammanlagt ca. 5 par, bl.a. vid slandammarna i Semla.

Kustpipare (Pluvialis squatarola)

Observeras ytterst sporadiskt under sträck. Ej årlig

Ljungpipare (Pluvialis apricaria)

häckar på en lokal med en till två par, antagligen ej årligen.

Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)

häckar allmännt i lämplig miljö

Dubbelbeckasin (Gallinago media)

tre observationer, två vid Åvestbo ängar, en vid Svartberget.

Dvärgbeckasin (Gallinago minimus)

en observation vid Åvestbo ängar

Morkulla (Scolopax rusticola)

häckfågel om än långt ifrån talrik. Har sannolikt gått tillbaks.

Storspov (Numenius arquata)

häckar med cirka 712 par i kommunen, arten har vidkänts en kraftig tillbakagång under senare tid. Observeras även under sträck vår och sommar/höst

Småspov (Numenius phaeopus)

observeras i stort årligen under sträck vår och höst

Rödspov (Limosa limosa)

observerad en gång, Åvestbo ängar den 6 maj 1970

Myrspov (Limosa lapponica)

observerad en gång vid Kottmossen 1964

Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)

allmän häckfågel vid större sjöar, i mindre antal vid större tjärnar och bäckar.

Skogsnäppa (Tringa ochropus)

häckar tämligen allmänt

Grönbena (Tringa glareola)

häckar med några få par, bl.a. på Kulflyten. Vanlig sträckfågel vår/höst

Rödbena (Tringa totanus)

observeras sporadiskt under sträck. Ej årlig

Svartsnäppa (Tringa erythropus)

observeras sporadiskt under sträck. Ej årlig

Gluttsnäppa (Tringa nebularia)

observeras årligen under sträck vår och höst

Brushane (Philomachus pugnax)

observeras sällsynt under sträck. Ej årlig

Kustsnäppa (Calidris canuta)

observerats en gång, den 11 sept. 1977 vid Onsjö

Kärrsnäppa (Calidris alpina)

observeras sällsynt under sträck, sammälagt fyra noteringar

Mosnäppa (Calidris temminckii)

observerats en gång, i maj 1983 vid slamdammarna i Semla

Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)

observeras sällsynt under sträck, två noteringar

Labb (Stercorarius parasiticus)

observerad vid ett tillfälle, i juli 1975 vid Åvestbo

Havstrut (Larus marinus)

observerad vid två tillfällen, april 1969, april 1983 vid Sundbo

Silltrut (Larus fuscus)

observeras tillfälligt, ej årligen.(juli 1983 vid soptippen Sänkmossen)

Gråtrut (Larus argentatus)

häckar fåtaligt i Kolbäcksåns sjösystem. Förekommer mellan 75-100 individer  
årligen vid soptippen på Sänkmossen

Fiskmås (Larus canus)

allmän häckfågel

Skrattmås (Larus ridibundus)

häckar i några små kolonier, bla. i Brandboviken och Hagarn.

Svarttärna (Chlidonias niger)

observerats vid ett tillfälle, i maj 1982 i Åmänningen

Skräntärna (Sterna caspia)

observerats vid ett tillfälle i tre ex. 1973

Fisktärna (Sterna hirundo)

häckar i enstaka par i Kolbäcksåns vattensystem

Silvertärna (Sterna paradisea)

observeras under sträck, ej årligen.(Kan vara förbisedd )

Skogsduva (Columba oenas)

häckningsstatus under senare år okänd i kommunen. Har minskat avsevärt och  
kan ev. vara utgången som häckningsfågel.

Ringduva (Columba palumbus)

allmän häckfågel

Turturduva (Streptopelia turtur)

observerad vid ett tillfälle, i juni/juli 1972

Turkduva (Streptopelia decaocto)

observerades årligen under 70-talet, är numera ej årsvis.

Gök (Coculus canorus)

häckar tämligen allmänt

Berguv (Bubo bubo)

observeras ytterst sporadiskt, senast vid Sänkmossen vintern 1983

Sparvuggla (Glaucidium passerinum)

ej ovanlig, antalet beror delvis på sorktillgång

Pärluggla (Aegolius funereus)

en tämligen allmän häckfågel vars antal beror på sorktillgång

Slaguggla (Strix uralensis)

häckning ej konstaterad, observeras ej årligen. Slagugglerevir finns alldelens i kommunens närhet varför chans till häckning bör kunna före ligga även i Fagersta.

Kattuggla (Strix aluco)

en tämligen allmän häckfågel vars antal delvis beror på sorktillgången

Hornuggla (Asio otus)

en tämligen allmän häckfågel vars antal delvis beror på sorktillgången

Jorduggla (Asio flammeus)

observeras ej årsvisst under sträck. Häckar i kommunerna norr om Fagersta varför häckning även i Fagersta kommun snart kan vara trolig.

Hökuggla (Surnia ulula)

observeras ej årsvisst, är en invasionsart som vissa år uppträder i större antal. Vintern 1983/84 var det massinväxion som även ledde till åtskilliga häckningar sommaren 1984.

Nattskärra (Caprimulgus europaeus)

häckar fåtaligt. Mest frekvent i områden vid Köpingsåsen och Kulheden.

Tornseglare, Tornsvala (Apus apus)

allmän häckfågel

Kungsfiskare (Alcedo atthis)

sällsynt gäst i Kolbäcksån, senast sedd 1977 i Semla

Härfågel (Upupa epops)

två observationer, i Semla aug. 1969, i Åvestbo sept. 1983

Gröngöling (Picus viridis)

tämligen allmän häckfågel

Gråspett (Picus canus)

har under åttiotalet observerats årligen. Arten är på viss frammarsch och häckning i kommunen bör kunna förväntas

Större hackspett (Dendrocopos major)

allmän. Antalet varierar något med kottillgången

Mellanspett (Dendrocopos medius)

en observation, den 19 juli 1965 vid Hyppenbenning

Mindre hackspett (Dendrocopos minor)

häckar fåtaligt, arten är på viss tillbakagång. Varje obs. bör noteras

Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos)

häckar med ett känt par sedan 1983. Har även häckat 1966 i Sundbo. Har sedan sextioalet observerats årligen.

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)

observeras numera ej årligen, arten har gått tillbaka under det senaste deceniet. Varje obs. bör noteras

Göktyta (Jynx torquilla)

tämligen allmän häckfågel

Spillkråka (Dryocopus martius)

tämligen allmän häckfågel

Sånglärka (Alauda arvensis)

allmän häckfågel

Trädlärka (Lullula arborea)

observeras nu årligen i häckningsmiljö efter att ha varit utgången sedan sextioalet. Observeras mest frekvent vid Kulheden och runt Kulflyten

Berglärka (Eremophila alpestris)

har observerats vid tre tillfällen, april-66, okt.-68, nov.-70

Backsvala (Riparia riparia)

häckar fåtaligt i några sandtag utefter Köpingsåsen

Ladusvala (Hirundo rufstica)

allmän häckfågel

Hussvala (Delichon urbica)

allmän häckfågel

Trädpiplärka (Anthus trivialis)

allmän häckfågel

Ängspiplärka (Anthus pratensis)

häckar tämligen allmänt vid större myrar. Mycket allmän under sträck

Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)

sällsynt förbisträckare vår och höst

Gulärla (Motacilla flava; rasen thunbergi)

årlig förbisträckare vår och höst

rasen M.a. flava har obs. sommartid vid Kulflyten 1982. Häckning ännu okänd

Forsärla (Motacilla cinerea)

enstaka observationer ej årligen i Semla, maj-juni 1968, 1969, 1971 och 1984. Häckning har sannolikt förekommit.

Sädesärla (Motacilla alba alba)

allmän häckfågel. En individ av rasen M.a. varelli häckade 1977 vid Rudgruvan tillsammans med en individ av nominarasen.

Törnskata (Lanius collurio)

allmän häckfågel, har ökat under det senaste deceniet i samband med den tilltagande kalhyggesavverkningen

Varfågel (Lanius excubitor)

observeras årligen under sträck vår och höst. Enstaka exemplar har vinterrevir, tex. i Semla. Har observerats sommartid varför häckning ej kan uteslutas. Någon säker häckning i kommunen har ännu ej rapporterats.

Stare (Sturnus vulgaris)

allmän häckfågel som dock är på tillbakagång i landet

Sidensvans (Bombycilla garrulus)

årlig invasionsgäst från okt till april. Är ej årsviss under vintermånaderna dec-febr.

Nötskrika (Garrulus glandarius)

allmän häckfågel

Skata (Pica pica)

allmän häckfågel, har ökat under det senaste deceniet i tätorten

Nötkråka (Nucifraga caryocatactes)

observeras ej årligen, flest fynd under hösten.

Kaja (Coryus monedula)

en tämligen allmän häckfågel

Råka (Corvus frugilegus)

årlig förbisträckare, oftast mars-april, sällan höst

Kråka (Corvus corone cornix)

allmän häckfågel

Korp (Corvus corax)

häckar fåtaligt. Uppträder i ett hundratal vintertid vid åtalar

Strömstare (Cinclus cinclus)

observeras årligen från okt. till april, mest frekvent i Semla och Snytenbäcken. Antal övervintrande rör sig runt 7-10 ex. Har även häckat i Semla.

Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes)

häckar fåtaligt, frekvent lokal är Trummelsberg

Järnspurv (Prunella modularis)

häckar allmänt

Flodsångare (Locustella fluviatilis)

har observerats tre gånger: juni -63 vid Melingssjön, juni -71 vid Hedtjärn, juni -83 vid Eriksbo, Bastmora

Gräshoppsångare (Locustella naevia)

observeras årligen i några exemplar. Häckar sannolikt med något par men har ännu inte kunnat beläggas

Sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus)

en art som påtagligt minskat under de senaste åren. Förekommer nu mer enstaka.

Kärrsångare (Acrocephalus palustris)

arten hade före åttioalet endast observerats vid ett par tillfällen men har under åttioalet observerats årligen. 1983 uppehöll sig två exemplar vid Backgården. Någon häckning är inte konstaterad.

Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus)

en art som påtagligt ökat under det senaste decenierna och får nu anses vara en tämligen allmän häckfågel.

Härmsångare (Hippolais icterina)

är mindre vanlig men förekommer dock årligen i enstaka exemplar i rätt miljö. Har sedan gammalt en liten stam vid Svartberget. Kan enstaka år uppträda mer allmänt som tex. 1982.

Trädgårdssångare ( Sylvia borin)

allmän häckfågel

Svarthätta (Sylvia atricapilla)

allmän häckfågel

Törnsångare (Sylvia communis)

tämligen allmän men har minskat beroende mycket på det igenväxande hagarna

Årtsångare (Sylvia curruca)

tämligen allmän häckfågel

Lövsångare (Phylloscopus trochilus)

allmän häckfågel

Gransångare (Phylloscopus collybita)

sträckare årligen förbi i enstaka exemplar. Häckning har konstaterats 1971 och 1972.

Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix)

tämligen allmän häckfågel

Kungsfågel (Regulus regulus)

allmän häckfågel. Antalet kan variera beroende på hur bister vintern varit.

Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca)

allmän häckfågel

Mindre flugsnappare (Ficedula parva)

observeras ej årligen. Sammanlagda antalet observationer rör sig runt tiotalet. Häckade med ett par 1973. Noterades på tre ställen under 1984 så arten kan tänkas vara på viss frammarsch.

Grå flugsnappare (Muscicapa striata)

allmän häckfågel

se in obs!?

Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)

arten har minskat påfallande under det senaste deceniet från att tidigare ha varit vanlig. Observeras numera på ett fåtal platser. Kommer tillbaka- gången att fortsätta?

Buskskvätta (Saxicola rubetra)

allmän häckfågel

Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)

arten har minskat påfallande under senare år och observeras nu i långt mindre antal än tidigare.

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochrorus)

arten har observerats i stort sett årligen sedan mitten av sjuttiotalet inom bruksområdet där den även har konstaterats häcka. Sannolikt rör det sig om ett par.

Rödhake (*Erythacus rubecula*)

allmän häckfågel

Blåhake (*Luscinia svecica*)

årlig förbisträckare vår och höst med tyngdpunkt på hösten

Näktergal (*Luscinia luscinia*)

observeras numera sedan några år tillbaka årligen i enstaka exemplar. 1984 var ett invasionsår då uppmot tio ex. sjöng på olika ställen i kommunen. Häckning ännu ej konstaterad med förefaller vara trolig.

Ringtrast (*Turdus torquatus*)

sällsynt förbisträckare vår och höst, mest vårnötingar.

Koltrast (*Turdus merula*)

allmän häckfågel, enstaka ex kan övervintra under milda vintrar

Rödvingetrast (*Turdus iliacus*)

allmän häckfågel

Dubbeltrast (*Turdus viscivorus*)

mindre allmän häckfågel

Taltrast (*Turdus philomelos*)

allmän häckfågel

Björktrast (*Turdus pilaris*)

allmän häckfågel, enstaka ex. övervintrar

Entita (*Parus palustris*)

allmän häckfågel

Talltita (*Parus montanus*)

allmän häckfågel

Tofsmes (*Parus cristatus*)

allmän häckfågel om än mindre talrik än övriga mesar

Blåmes (*Parus caeruleus*)

allmän häckfågel

Svartmes (*Parus ater*)

allmän häckfågel

Talgexe (*Parus major*)

allmän häckfågel

Stjärtmes (*Aegithalos caudatus*)

en tämligen allmän häckfågel om än aldrig i något större antal. Synes ha ökat något under åttiotalet.

Lappmes (Parus cinctus)

observerad vid ett tillfälle, i januari 1980 vid Sänkmossen.

Nötväcka (Sitta europaea)

tämligen allmän häckfågel

Trädkrypare (Certhia familiaris)

allmän häckfågel

Gråsparv (Passer domesticus)

allmän häckfågel i tätortsmiljö

Pilfink (Passer montanus)

arten har under de två senaste decinerna ökat påfallande och är numer en allmän häckfågel i tätortsmiljö.

Bofink (Fringilla coelebs)

allmän häckfågel, enstaka kan övervintra

Bergfink (Fringilla montifringilla)

talrik förbisträckare vår och höst, enstaka kan övervintra. Häckning konstaterad 1982.

Domherre (Pyrrhula pyrrhula)

tämligen allmän häckfågel vars numeär tycks vara på väg neråt.

Stenkäck (Coccothraustes coccothraustes)

observeras ej årvisst, har häckat 1981 på "Andra sidan"

Grönfink (Carduelis chloris)

allmän häckfågel

Grönsiska (Carduelis spinus)

allmän häckfågel

Steglits (Carduelis carduelis)

observeras numera ej årvisst och får nu anses vara en tämligen sällsynt gäst. Arten har observerats under alla årstider.

Hämpling (Carduelis canubina)

arten har minskat påtagligt under det senaste deceniet och osäkerhet råder om fågeln fortfarande är häckfågel i kommunen eller ej.

Vinterhämpling (Carduelis flavirostris)

observeras ej årvisst under vår- coh höststräck. Kan vissa höstar ses i stprt antal.

Gräsiska (Carduelis flammea)

strykfågel under vinterhalvåret, observeras då regelbundet

Snösiska (Carduelis hornemannii)

har observerats vid enstaka tillfällen, ej årvisst. Får anses vara en sällsynt gäst.

Rosenfink (Carpodacus erythrinus)

en invandrare under slutet av sextioalet och som nu upprätthåller en liten stam. Antalet sjungande hanar bör ligga mellan 15-20 ex.

Tallbit (Pinicola enucleator)

observeras i regel årvisst i enstaka exemplar. Vissa år uppträder arten mer invasionsmässigt och är då förhållandevis talrik.

Mindre korsnäbb (Loxia curvirostra)

allmän häckfågel vars talrikhet är beroende på kottillgången.

Större korsnäbb (Loxia pytyosittacus)

artens status är litet utredd mest beroende på förväxlingsproblem med den mindre arten vid bestämning. Arten är dock långt ifrån så talrik som den mindre korsnäbben och får utifrån nuvarande erfarenheter närmast betraktas som ganska ovanlig. Talrikheten är beroende av tillgången av framförallt tallkottar.

Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera)

har observerats vid två tillfällen, vintern 1976/77 och i okt.-82

Kornsparv (Miliaria calandra)

en observation, i Sundbo maj 1967

Dvärgsparv (Emberiza pusilla)

en observation, vid Backgården i april 1969

Videsparv (Emberiza rustica)

har observerats vid fyra tillfällen, tre i april/maj, ett i sept.

rain abs? Skulle knappast fala  
granskiva idag på kort av senare  
dag  
Shy!!

Ortolansparv (Emberiza hortulana)

observeras ej årvisst under sträck. Har tidigare häckat men är nu utgånger sedan ett antal år, dock är arten stadd i en viss ökning av sin utbredning och kan kanske förväntas häcka på nytt i kommunen.

Sävsparv (Emberiza schoeniclus)

allmän häckfågel

Gulsparv (Emberiza citrinella)

allmän häckfågel

Summa arter: 212

Lappsparv (Calcarius lapponicus)

årlig förbisträckare i enstaka exemplar

Snösparv (Plectrophenax nivalis)

observeras årligen under vinterhalvåret i mindre flockar

Följande arter häckar regelbundet i Fagersta kommun:

storlom	hornuggla	buskskvätta
smålom	nattskärra	rödstjärt
skäggdopping	tornseglare	svart rödstjärt
knölsvan	gröngöling	rödhake
kanadagås	större hackspett	koltrast
gräsand	mindre hackspett	rödvingetrast
kricka	göktyta	dubbeltrast
knipa	spillkråka	taltrast
småskrake	sånglärka	björktrast
storskrake	backsvala	entita
ormvråk	ladusvala	talltita
bivråk	hussvala	tofsmes
duvhök	trädpiplärka	blåmes
sparvhök	ängspiplärka	svartmes
fiskgjuse	sädesärla	talgoxe
lärfalk	törnskata	stjärtmes
tjäder	stare	nötväcka
orre	nötskrika	trädkrypare
jätpé	skata	gråsparv
trana	kaja	pilfink
tofsvipa	kråka	bofink
mindre strandpipare	korp	domherre
ljungpipare	gärdsmyg	grönfink
enkelbeckasin	järnspark	grönsiska
morkulla	gräshoppsångare	rosenfink
storspov	sävsångare	mindre korsnäbb
drillsnäppa	rörsångare	större korsnäbb
skogssnäppa	härmångare	sävspark
grönbena	trädgårdssångare	gulspark
gråtrut	svarthätta	
fiskmås	törnsångare	
skrattmås	ärtsångare	
fisktärna	lövsångare	
ringduva	grönsångare	
gök	kungsfågel	
sparvuggla	svartvit flugsnappare	
pärluggla	grå flugsnappare	
kattuggla	stenskvätta	

Summa arter: 105

Följande arter häckar mer oregelbundet och tillfälligt i Fagersta kommun:

svarthakedopping  
tornfalk  
rörhöna  
sothöna  
skogsduva  
turkduva  
hökuggla  
vitryggig hackspett  
tretåig hackspett  
trädlärka  
forsärla  
**strömstare**  
gransångare  
mindre flugsnappare  
bergfink  
stenknäck  
hämpling

Summa arter: 17 arter

Följande arter kan man förvänta häcka inom snar framtid i Fagersta kommun  
eller som redan nu häckar men är hittills förbisedda:

sångsvan	gråspett
vigg	gulärla
blå kärrhök	varfågel
vattenrall	nötkråka
småfläckig sumphöna	kärrsångare
kornknarr	näktergal
gluttsnäppa	videsparv
slaguggla	ortolansparv
jorduggla	