

TEREKSNÄPPA I ROCKHAMMAR 30.5.1987

Jan-Erik Malmstigen

I samband med årets dygnsrally den 29-30 maj
äkte jag till sammans med min son Johan till
den lilla sländammen i Rockhammar. Dammen ut-
gör en del av Sverkestaån innan den vidgar sig
i Hammarsjön. Dagen dessförinnan hade jag obser-
verat en gluttnäppa på samma plats och ville
nu kontrollera om den fortfarande fanns kvar.

Klockan var strax efter åtta på morgonen den
30:e. Vi upptäckte snart en vadare som med sin
långa avtagt uppåtböja näbb genast förde tanken
till tereksnäppa. Eftersom jag inte hade någon
erfarenhet av denna art var jag inte helt säker,
men jag såg genast att jag hade att göra med en
för mig helt ny bekantskap. Jag började därför
att skriva ner så mycket jag kunde av detaljer i dräkt och beteende. Förtom
denna snäppa fanns ytterligare några vadare i dammen, nämligen skogsnäppa,
grönbens, gluttnäppa och monsnäppa.

I samband med återsamlingen senare på dagen vid klubblokalen i Blirterboda
äkte vi alla deltagare i dygnsrallyt till dammen i Rockhammar i
förehopningen att fågeln fortfarande skulle finnas kvar. Vi hade tur, det
förra vi fick höra när vi steg ur bilarna var dess karaktäristiska spel-
late och den visade sedan upp sig mycket fint. Följande morgon kunde terek-
snäppan dock inte återfinnas och vi tog därför för givet att den gett sig
av. Sent på kvällen den 31 maj återupptäcktes den dock av Per Angelstam
för att därefter aldrig upptäcktes.

Beskrivning: Fågeln gav ett ljus inttryck, likt en gluttnäppa. Storleken
var dock obetydligt större än grönbenans. Undersidan ljus och ovansidan grå
med två tydliga mörka längsgående ryggband. Näbben mörk och tydligt upåt-
böjd. Enligt handböckerna skall benen vara gula, detta exemplar hade dock,
som jag uppfattade det, gulröda ben. När jag senare på dagen till sammans
med de andra såg tog fågeln framifrån och i perfekt ljus var dock benfärgen
meden "rädda", alltså mera gul än röd. När snäppan flög iväg ett stycke visa-
de den upp ett ljusgrått band utmed bakkanten av vingen. Stjärten och över-
gumpen var ljusgrå. Till slut var fågeln i dubbelfärg (grått och gult).

Till beteende påminde den mest om en drillsnäppa när den typiskt vippade

Utbredning och tidigare gjorda fynd i Sverige.

Häckar över stora delar av norra Asien. Västgränsen går vid inre delen
av finska viken samt med en isolerad förekomst vid Bottenviken.
Har observerats årligen i Sverige sedan 1976. Tom 1986 finns sammanlagt
51 fynd i Sverige, de flesta i maj, 16 stycken.

Ill. Bo Dahlström

LUNDSÄNGARE VID ÄMTEN 5.6.1987

Per Angelstam

Ett av de många forskningsprojekten vid Grimsö forskningsstation studeras
hur ett skogbestånds storlek respektive kvalitet (t ex andel lövskog,
tillgång på bohål mm) påverkar fågelfaunas artrikedom och sammansättning.
Ett av skogsbestånden är beläget i Grimsö-områdets södra del, mellan sjön
Gröningen och Sverkestain. På sommaren 1914 härjades dessa trakter av en
skogbrand. Så småningom växte fläckvis en mycket lövrik (björk ochasp)
skog upp och som nu på ett markant trevligt sätt avviker från omgivande
i stort rena barrskogar.

Den 5 juni 1987 gjordes den avslutande revirkarteringen i områdets östra
del. Mot slutet av morgonpasset, som bjudit på flera smätrevliga (för att
vara mitt ute i skogen) observationer som stjärtmes, blåmes, svarthäxa,
träddäggssingare och järpe, hör jag en stark och snabb sångstraf som upp-
repas ihärdigt. I tonen påminner sången mest om färdsamyg, men mer kortare
och mer stereotyp. Sångaren gickar mig högt uppe i trädkronorna - än i ren
björkskog i en liten våtmark, än på en liten blockig kulle med björk, tall
och gran - det tar en dryg kvart innan jag får se en första skyt av en
lösningarlik fågel. En stund senare ser jag den gott i toppen av en björk:
anden är mindre än en lövslängare, mer "hoppig" och har en antydan till ett
vingband.

Gräver i minnet och kommer ihåg två tidigare möten (en gång på Öland, en
gång i Skåne) med denna art - lundsångaren. Efter morgonens inventerings-
pass konfirmerar jag bestämning med hjälp av bandinspelningar och littera-