

TJOCKFOT VID HÄGERNÄS 15 JULI 1988

GRZEGORZ MIKUSINSKI

Den 15 juli 1988 var vädret så gott som klart. Den dagen vid 13.00-tiden befann jag mig på ett hygge nära Hägernäs söder sjön Norrmogen i Lindesbergs kommun. Jag ämnade utföra inventeringsarbete åt Grimsö forskningsstation.

Lokalen var helt vegetationsfri, nyligen kalavverkad, flera vattenpölar och marken delvis täckt av hyggesavfall och steniga partier.

När jag korsar ytan observerar jag en fågel iflykten. Den har relativt korta vingar i förhållande till kroppslängden. Fjäderdräkten var ljusbrun. Jag såg tydligt två vita fläckar på vingarna och vidare ansiktet - vit ring runt ögat. Den gula näbben var kort med svart spets. Efter några sekunder var jag säker "-det är en tjockfot!" Detta var min första observation av arten, vilket glädde mig mycket. Jag hörde fågelns läte; hög, liknande storspovens som upprepades flera gånger. Fågeln flög mot mig vid två tillfällen sista gången på omkring 30 meters avstånd. Därefter flög tjockfoten bort i sydostlig riktning.

Jag observerade fågeln i handkikare (Zeiss Jena 10x50). Åter i bilen, upptäckte jag, i fälthandboken att tjockfoten är mycket sällsynt i Sverige. Vid det tillfället kände jag mig verkligen nöjd.

Red kommentar:

Tjockfoten förekommer som häckningsfågel sparsamt till sällsynt i Syd- och Mellaneuropa. Den finns där på torra, sandiga och steniga hedområden, även på åkermark. Tjockfoten är en medelstor marklevande fågel med stort huvud, kraftig näbb och stort gult öga. Är mest aktiv i skymning och gryning och det stora ögat är en anpassning att se i svagt ljus.

Tjockfoten vid Hägernäs var den första även för Västmanland. I landet har arten tidigare setts 19 gånger, den senaste 1987. Övriga fynd under 1980-talet gjordes 1984 och 1981.

Rapporten har granskats och godkänts av SOF:s raritetskommitté (rk).