


JANUARIINVENTERINGEN 1990

MATS ANDERSSON

I denna Januariinventerings sjätte årgång deltog 36 personer. Antalet deltagare ligger därmed i nivå med tidigare års. Under månaden observerades 62 fågelarter, vilket är lika med 1988 års inventering och högsta antalet arter under de sex åren som inventeringen pågått.

Inte mindre än sex nya arter noterades detta år och dessa var vitkindad gås, kungsfiskare, sädesärla, rödhake, tallbit och vinterhäpling. Sammanlagt sedan Januariinventeringens startår (1985) har därmed 81 fågelarter observerats under månaden. En sammanfattning av årens resultat finns i tabellen nedan.

Några karaktärsarter denna januari fanns som uppträdde i ovanligt stort antal. Det gäller kanske främst gröniska, sidensvans och björktrast. Dessutom fanns starar i en omfattning som aldrig tidigare. Den rika tillgången på granfrön har denna vinter även gynnat mindre korsnäbb. Anmärkningsvärt var även de två fynden av rödhake, som tidigare endast observerats vid ett tillfälle vintertid i kommunen. Även fyndet av sädesärln är uppseendeväckande, eftersom fågeln sågs redan i december är det frågan om övervintring, vilket är lika med första fyndet i kommunen.



VÄDER

Januari 1990 inleddes med högtryck och svaga vindar. Från den 2 var en eller-tid vädret mulet med lått nederbörd. Temperaturen höll sig kring noll eller någon minusgrad. Den 7 övergick lågtrycken huvudrullen och en kraftig västlig luftström etablerades över hela Skandinavien. Detta lågtrycksbelonade väder uppträde direkt i stort sett hela månaden ut. Månaden blev såldes mycket nederbörsrik och i samband med lågtryckens uppted kraftiga vindar vid flera tillfällen. Något snöläcke såg man inte till denna januari och det avseende blev det en upprepning av fjolårets rekordvarma januariinland. Endast den 25 och 26 januari föll snö i någon närmivärda omfattning i våra trakter som följd av några dagar med kallt väder. Avslutningen blev dock åter mild så att månaden också blev mildare än normalt (Källa: SMHI Väder och Vatten 1990).

RESULTAT

Åtom nämndes inledningsvis deltog 36 personer i årets Januariinventering och önamnlagt såg dessa 62 fågelarter. Denna inventering är enkelt konstruerad och alla kan också delta på sina egna villkor. En särskilt framtagen blankekt bifogades Pandion 1989:3 till samtliga medlemmar. På den antecknades de olika arterna man noterade under januari och för vissa arter något utför- lägre med datum och antal och lokal. Detta är således en inventeringsform som alla kan delta i och var och en efter sina förutsättningar.

Vid sidan om vinterfågelinventeringar, ingående i Svenska Vinterfågeirak-ningen som bedrivs i kommunen, bidrar den Arliga Januariinventeringen, som också medlemmar deltar till kunskaper om vinterfågelfaunan hos oss.

Vimare vid utlotningen av boken "Sveriges Fåglar" blev Sven-Ivar Andersson.

ARTLISTA

Knötsvan. En observation föreligger. Ett ex fanns i närheten av Gröna bron och i Bottenå i norra delen av St. Lindeessjön, Lindesberg från 6.1 och månaden ut (TK, MK, m fl). Enstaka knötsvanar kan göra övervintringsförök milda vintrar, sålunda fanns en observation även den milda januari 1989.

Sångsvan. I är rapporterad med betydligt fler ex jämfört med 1989 och dess-utom från fler lokaler. Santliga observationer kommer från Arboågens vat-tendrag med tillhörande sjöar. I Sjömosjön observerad från den 10.1 och månaden ut. De största ansamlingarna fanns i sjön i slutet av månaden med 22 ex den 30.1 och 41 ex den 29.1 (SOE, JM, CE, MR, UJ, PJ, MK). Övriga ob-servationer var 2 ex Sörängarna 1.1 (SIA), 1 ex Storströmmen 2.1, 13.1 (MK, MU), 4 ex Oppboga 3.1 (MJ), 2 ex Ringaby 9.1 (JTN), 1 ex St. Lindeessjöns is 13.1 (JM, ER), 1 ad + 1 juv LJAB, Lindesberg 13.1 (JM) och 5 ex samma lokal 20.1 (TK).

Kanadagås. Endast noterad från södra kommundelen med 2 ex Storbron, Frötuna perioden 1.1 - 13.1 (MK mfl) och från Sjömosjön med 2 ex perioden 16.1 - 31.1 (MK, TH mfl). Observationerna bör gälla samma individer. Kanadagåsen är i vår kommun inte artig 1 januari, så t ex fanns ingen ob-servation under fjolårets milda januari.

Vitkindad gås. 1 ex Nederby, SO Fellingsbro 30.1 (UJ) Ny art för januari. Tidigare finns fynd från Sjömosjön i december 1966 och 1984 med 1 ex och från 1989 finns en observation i februari, dessa är enda vinter-fynden i kommunen.

Grässand. Liksom tidigare är uppehåll sig flest gräsänder i St. Lindeessjön, uppskattningsvis 100 ex fanns hela månaden i anslutning till Gröna bron i det öppna vattnet (MA, JM, MK mfl). Därutöver fanns 50 ex i Vibyviken 1 NV Väringen den 13.1 (JM), 30 ex i Sjömosjön 30.1 (MK) och 31 ex vid Opp-boga i början av månaden (CE) vilka var de största flockarna.

Knipa. Endast rapporterad från södra kommundelen och liksom tidigare är flest i Sjömosjön. Som mest sågs i Sjömosjön 50 ex 17.1 (JTN). Utöver dessa fanns endast enstaka knipor i Arboågens vattensystem från Sjömosjön och upp till Väringen. Observationerna ligger i nivå med tidigare års och i stort på samma lokaler.

Salstrukke. 1 par uppehöll sig i trakten av Storbron vid Frötuna, SV Fellings-bro, hela månaden. Parets var även synligt i Sjömosjön inte långt därifrån. (PJ, JM, MJ mfl). Tidigare finns årtå vinterfynd från samma trakt, då har det emellertid endast varit en fågel av arten hon- eller hankön.

Tabell. Resultat från Januariinventeringen 1985 - 1990.

	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Antal rapporter	21	36	36	40	32	36
Summa arter/år	57	56	59	62	50	62
Totala antalet arter, ackumulerad	63	68	75	73	81	

Storskrake. Observerad i trakten av Sjömosjön hela månaden, som mest sags 16 ex 28.1 (JM), dessutom sags en hane i Vibyviken, Väringen 22.1. (JM). Övervintringsförskök görs så gott som årligen med enstaka fåglar, denna vinter tycks dock något fler än normalt setts.

Kungsörn. 1 ex Storbron, Frötuna 4.1 (JM,PJ,SW), 2 ex Blåsäsen, Varingen 11.1 (RN), 1 ex Skrymtarboda 20.1 (Ohe), 1 subad + 1 juv Nederby 20.1 (MK,PJ), dessutom utanför Januariinventeringen rapporterad från Hammarbacken med 1 ex i slutet av månaden (L Nyqvist gm Ma). Observationerna ligger inom tidigare kända vinterrevir.

Grätrut. 1 ex soptippen Sägmossen 13.1 (JM), 1 juv Vibyviken 20.1 (JM) är enda observationerna och i nivå med fjolårets.

Hökguggla. 1 ex Frövikfors observerad från och till hela månaden (JM,EJ,AS,BN mfl), 1 ex Skrymtarboda 13.1 och 24-25.1 (Ohe). Båda fåglarna är övervintrande och har varit stationära på lokalerna hela vintern.


Kattuggla. 2 rop Hammarskogen, Vanneboda 5.1 (JM), 1 ex Åtorp 6.1 (ER), 1 ex Skrymtarboda 13.1 (Ohe), 1 ex stationär hela månaden Lis (JTn) och Nybble (CE), 1 ex Albackstän, Råsvallen 20.1 (JK).

Hornuggla. 1 ex Sorängarna 22.1 (JK). Andra fyndet i samband med Januariinventeringen.


Kungsfiskare. 1 ex hördd och observerad i Arbogaån i närheten av Frötuna och Oppboga 3.1, 7.1 och 14.1 (JM,MK,PJ,MI). Tidigare finns winterobservationer vid tre tillfällen; Oppboga 1952, Lindesberg 1976 och Storå 1980.

Mindre hackspett. 1 hane Strömstorp 1.1 (JM), 1 ex Hjältyra 6.1 (SOE), 1 ex Filmansboda 7.1 (JM,ER).

Säddsärla. 1 ex Lindeskolan 19.1 (KJ), 1 ex Biblioteket Lindesberg 28.1 (MA). Fågeln som bedöms vara samma individ sågs även 1 december 1989 och är därmed kommunens första övervintrande sädesärla. Norr om flyttar säsdesärorna i september till Mellersta Östern och nordöstra Afrika. Försök till övervintring sker dock nästan årligen i främst södra Sverige.

Stationära hökgugglor

fanns på två lokaler.



Sidenvans. Sidenvansen uppträdde i större omfattning än 100% tidigare år och flera större flockar sågs (se fig intill). De största flockarna var ca 300 ex Frövi (GE), 200 ex i Lindesberg 6.1 och 28.1 (TK, MA).

Strömstare. Totalt sågs 20 ex på 13 lokaler. Flest sågs vid Nyhammar i Sverkestaånn 16.1 då 5 ex fanns (TK).

Gårdsnyg. 1 ex Oppboga 2.1 är enda fyndet (UJ,PJ,MJ).

Rödhake. 1 ex Storå under månaden (OA), 1 ex Strandvägen, Lindesberg 15.1 (MRe). Två fynd är mycket anmärkningsvärt och måste bero på den milda vintern. Tidigare finns endast ett fynd; 1 ex Frövi 6.1 1977.

Koltrast. Rapporterad i särklassigt större omfattning än något tidigare år (se fig intill). Dessutom observerad i större delen av kommunen. Omkring 30-talet ex har setts i Björktrast. Även björktrasten har rapporterats i stor omfattning under månaden. Stora flockar på upp till 100 ex sågs i början av januari, därefter dock i mindre antal.

Vartågäl. 1 ex Västervalla 6.1 (JM), 1 ex Nåset, St Lindes- sjon 6.1 (PMR), 1 ex Albackstän, Råsvallen 20.1 (JK), 1 ex Sjömosjön 20 - 28.1 (TH,SOE mfl), 1 ex Rynningefors 24.1 (JTn), 1 ex Kolnholm 30.1 (UJ).

Star. Mycket amärkningsvärt denne januari var att så många observationer av starar gjordes. Flockar sågs hela månaden och redan 1.1 sågs 20 ex i Frövi (OH), i Fellingsbro sågs stora flockar hela månaden och som mest 42 ex 29.1 (JTn). Dessutom finns rapporter om 25 ex Skulsta 20.1 (PJ), 24 ex Oppboga 9.1 (JTn), 1 ex soptippen Sägmossen och 1 ex Lindesberg 13.1 (JM,ER) och flera observationer i Storå under månaden (OA).

Bofink. 1 ex Östermalmsvägen, Lindesberg 1.1 (TK), 1 par Frövi 10.1 (BN), 1 ex Fellingsbro 21 - 31.1 (MK,PJ,MJ) dessutom 1 ex under månaden rapporterad från Storå (OA) och Fågelstigen, Lindesberg (CL). Trots mild januari och tidigare under vintern, fä fynd.


Bergfink. 1 ex Frövi 3.1 (JM), 2 ex 21.1 (PL), 2 ex dagligen Fågelstigen, Lindesberg (CL) och 1 ex Strandvägen, Lindesberg (MRe), 1 ex Fellingsbro 14.1 3 ex 27.1 (PJ,MJ mfl). Antalet fynd ligger i stort i nivå med tidigare års.

Steglits. 4 ex Storå (MA), 5 ex Medinge 3.1 (JM). Grönsiska. Grönsiskan har denna januari uppträtt i ett antal som vida överstiger tidigare januari inventeringar. Arten var ovanligt talrik hela månaden och fanns dessutom i flockar av sällan skedad slag (se figur intill).

Grässika. Jämfört med grässiskan har grässiskan under vintern uppträtt mer "normalt" med flest observationer i slutet av månaden. Några större flockar om 30-talet ex har setts och den största var 100 ex vid Sjömo 27.1 (SOE). I övrigt rapporterad med enstaka ex jämt spritt över kommunen. I figuren intill redovisas grässiskans uppträdande under de olika år som inventeringen pågått.

Vinterhämpling. 1 ex Essingeholm, Fellingsbro 27.1 (UJ). Winterhämplingen är ganska lik grässiskan men saknar rött på huvudet. Dräkten är mest tecknad i en ljus brun ton och under vintern är näbben gul. Berör vårt trakter mest under flyttningen senare på hösten, dock kan den övervintra färdigt upp i Mellansverige. Hos oss finns emellertid endast en tidigare vinterobservation; 35 ex Västvalla 5.12 1987.

Mindre korsnäbb. Ytterligare en art som uppträtt i mycket stort antal denna vinter. Korshäbbarnas närvoro i skogarna är helt beroende av om det finns tillgång till granfrön. Ingen som vistats i skogarna denna vinter har kunnat undgå att observera att grantopparna varit tyngda av kottar.



Figurerna ovan visar i procent hur många av rapportörena som observerat arten.

RAPPORTÖRER:

AS=Andreas Sandberg, BN=Bengt Nyman, CE=Christer Eriksson, CL=Christina Lundqvist, ER=Eje Rylander, EJ=Erik Jansson, GE=Gösta Eklöw, JK=Jonas Kling, JM=Jan-Erik Malmstigen, JTr=Johnny Tegin, JP=Järker Portat, KJ=Kjell Jansson, LS=Lennart Sandberg, MA=Mats Andersson, MJ=Magnus Jacobsson, MK=Magnus Köpman, MR=Mattias Rudenvall, MRE=Margit Ressare, OA=Ola Almkvist, OH=Olov Häggström, OHe=Olov Helge, PL=Pekka Lampu, PJ=Per Jacobsson, PMR=Per-Martin Ramberg, SIA=Sven-Ivar Andersson, SOE=Sven-Olof Eriksson, TH=Tomas Haraldsson, TK=Thomas Kellerth, UJ=Ulf Jacobsson.

Dessutom rapporter från Jerry Andersson, Gunnar Gustafsson, Jan Timre, Thomas Björck, Inger och Klas Holmquist, Gösta Granlund och Bengt Östlund.

ETT STORT TACK TILL ALLA DELTAGARE OCH VÄL MÖTT I JANUARI 1991 !

BEVAKA FÄGELFAUNAN!

