

FÖRSTAFYND I LINDESBERGS KN

SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA PÅ SÖRÄNGARNA 5 JUNI 1990

MATS ANDERSSON

Befann mig på Sörängarna kvällen den 5 juni 1990. I ett buskage intill vägen sjöng en kärrsångare, som avlyssnades helt nära. Plötsligt flög en liten mörk fågel in i buskaget. I flykten uppmärksammade jag ett svart huvud med vitt parti i nacken. Utseendet påminde därvid om sävsparvens. Åter sågs fågeln, nu exponerat och kunde då artbestämmas till svarthakad buskskvätta (*Saxicola torquata*), en hane.

Det var en liten och satt fågel. Huvud och strupe i princip svart, med lysande vitt parti i nacke och halssida. Rygg och stjärt helt mörk, endast något litet vitt på övergumpen kunde skönjas. Undersidan svagt rödaktigt brun. I flykten korta vingar och därmed snabb vingförling. Inga läten hördes.

Sörängarna är en intressant fågellokal strax norr Lindesberg som i väster gränsar till sjön Råsvalens sydligaste del. Området utgörs dels av marker närmast sjön, dels av ängar och odlade fält. Det är på så vis ett relativt öppet landskap, dock finns tätare ridåer och enstaka buskar. Riksväg 68 skär genom området, liksom avtagsvägen till Hagabergsområdet i Lindesberg.

Svarthakade buskskvättan har påträffats ca 200 gånger i Sverige och flest fynd från södra och sydöstra delen. Arten har uppträtt med två raser i Sverige, dels rasen *S. t. rubicola*, närmast häckande på Jylland, dels rasen *S. t. maura*, som häckar i Sibirien. Flest fynd gäller troligen den förstnämnda (SOF 1990).

Litteratur. SOF. 1990. Sveriges fåglar. 2:a uppl. Stockholm.