

88295

RJK/2 1970

I närheten står rådjurshäcken tom. Så har den stått hela vintern. Då jag åkt 200 meter ligger skallen på rådjur nummer tre framför mig. Man blir nästan ursinnig.
 Jag åker hemåt, kommer ut vid skjutbanan. Två ormvråkar möter mig. De första. Sinnelaget lättar.
 Över Bårhuset kommer två prickar. De flyger söderut. Tofsvipor.
 Dagen är räddad flera gånger om. Vid Täkten sjunger varfågeln. Livet leker.
 Klockan ? Två. Då har jag varit ute i tvåochenshalvtimme.
 Det lönar sig att ligga länge ibland.

B.E.

_ _ V Ä S T E R S J Ö N 1 9 7 0 _ _

Nedan redovisas resultatet av observationerna av vadare vid Västersjön. Uppgifterna grundar sig främst på iakttagelser från 1970 och i viss mån från 1969. Området har ej hållits under observation förrän innevarande år, varifrån ett gott material erhållits. Då det gäller rastande fåglar är det maximala antalet som setts samtidigt medtaget, om ej annat angivits.

Tofsvipa: Arten är allmän vår som höst. Under hösten flockar om upp till 150.

Större strandpipare: Under våren som mest tre samtidigt, under hösten upp till 12.

Mindre strandpipare: Ses oftare under vårsträcket än föregående art. Upp till 5 samtidigt. Under sommaren och hösten enstaka ex.

Kustpipare: Endast observerad på höstflytt. Ett ex. 31.7 1.8 5.8 2 ex. 13.9 överflygande, minst 1 ex. 3.10 (läte).

Ljungpipare: 1 ex. 6.5 8.5 29 ex. 9.8 överflygande.

Roskarl: 1 ex. rastade den 10 maj.

Enkelbeckasin: Genomflyttare.

Dvärgbeckasin: Endast en observation från mitten av 50-talet föreligger, då ett ex. spelade vid sjön under två veckor i maj.

Storspov: Observeras vår och höst i flockar upp till 40 ex.

Småspov: Enstaka observationer vår och höst. Endast överflyg.

Myrspov: Ett ex. på bankarna 6.9.-1969.

Skogssnäppa: Ses vår och höst. På våren den tidigaste snäppan.

Grönbenä: Under vårflyttningen som mest 25 ex.

Drillsnäppa: Allmän vår - höst. Troligen häckar något par på östra stranden.

Rödbenä: Sällan fler än tre samtidigt. Sista väriakttagelsen 29.5 första höstiakttagelsen 11.7.

Svartsnäppa: Sedd i flock upp till 7. Första höstobs. 7 juli.

Gluttsnäppa: Efter grönbenan den vanligaste storsnäppan.

Kustsnäppa: Ett utfärgat ex. sträckte mot söder den 7 september.

Småsnäppa: Endast höstobservationer är gjorda. Uppskattningsvis passerade ca: 20 stycken under - 70.

Mosnäppa: Sedd endast på våren. Då i sällskap upp till 3. st.

Kärrensäppa: Den talrikaste av Calidrisarterna. Under sept. har sammanlagt 229 st. setts fördelade på 16 obs.dagar. Motsvarande siffror 1969 är 6 st. under 20 obs.dagar. Toppsiffran hamnar på den 12 sept. med 40 rastande fåglar. Inga vårobservationer.

Spovsnäppa: 1 ex. 28.8 12.9 13.9 20.9

Brushane: Under våren är den sedd i flockar upp till 40 ex. På hösten mindre talrik men enstaka större flockar (27 ex.)

G.L.

Fotot på nästa sida: Rastande kärrensäppor på dybankarna vid Västersjön. Foto: G.L.

efte
till
En p

arter
spric
helt
rarit
av Sv
plats
der f
frits
kan v
konti
repre
bestä