

HORNUGGLOR I SURAHAMMARS KOMMUN 1973-1974.

I Naturklubbens årskrift 1974 redovisades resultatet av Naturklubbens inventering av pärlugglor i Surahammars Kommun åren 1973 och 1974. Dessa båda år undersöktes också förekomsten av hornugglor inom kommunen.

Då gnagartillgången var mycket god under de båda åren, var det ganska tätt mellan hornugglereviren. Dessa är mycket lättare att upptäcka än pärlugglereviren. Ropande hornugglor kan man få höra på våren, men det enklaste sättet att kolla hornuggleförekomsten är att leta efter utflugna ungfuglar. Dessa är inte svåra att upptäcka, eftersom ungaras genomträngande skri hörs på ganska långt håll under sommarnätterna.


1973 upptäcktes ungar på 8 olika platser i kommunen. Observationer av ropande eller jagande exemplar rapporterades från ytterligare 5 lokaler. 1974, då gnagartillgången nådde sin kulmen, upptäcktes ungar på 25 olika platser. Dessutom sågs eller hördes vuxna fåglar på 4 andra platser.

Antalet utflugna ungar vid de olika boplatserna växlar, men det är inte konstaterat att något hornugglepar fått ut mer än 4 ungar.


Att hornugglan är enormt beroende av smågnagartillgången bevisas genom att det inom kommunen inte konstaterats någon häckning av denna uggla under det gnagarfattiga året 1975.

Kartorna på nästa sida visar tätheten av de olika reviren under de båda undersökningsåren.

Thomas Forsberg



Skala 1:250000



88352

RNK/R 1975