

## Meddelanden

### 1. En observation av havsörn (*Haliaeetus albicilla*) gripande byte i flykten

Nedan beskrivna händelseförlopp iakttoogs vid Sövdesjön i Skåne den 6 januari 1961. I sjön låg 7 skäggdoppingar (*Podiceps cristatus*), 3—400 storskrakar (*Mergus merganser*), omkring 50 krickor (*Anas crecca*) samt ca 1000 gräsänder (*A. platyrhynchos*). Två havsörnar sågs sitta på stängselstolpar på den s.k. Holmabacken, W om sjön. Medan örnnarna betraktades i kikare, lyfte de och flög ut över vattnet. Båda var vitsjärtade, adulta fåglar. Det blev oro bland simfåglarna i sjön, samtliga gräsänder och krickor reagerade med uppflog. Alla storskrakar förblev dock liggande kvar i vattnet. De reagerade endast genom att sträcka på halsarna och sluta sig samman i en tätare flock (jfr VF 19 (1960): 170). Örnnarna fortsatte ut över vattnet utan att till synes taga någon notis om storskrakarna. Plötsligt gjorde en av örnnarna ett utfall mot en passerande flock gräsänder. Anfallet verkade mycket klumpigt och ovikt, och änderna klarade sig undan. Örnnarna började nu kretsa runt över sjön. Åtskilliga andflockar passerade dem på närråll utan att något inträffade. Emellertid kom en ensam gräsand flygande i riktning mot havsörnnarna. Den ena örnen gjorde en häftig attack mot gräsanden. Denna försökte undkomma genom att stiga snett uppåt men råkade därvid flyga rakt i klorna på den andra örnen, som befann sig snett ovanför den första. Efter detta lyckade kap flög örnnarna tillbaka bort mot Holmabacken.

Det tycks endast i sällsynta fall förekomma, att havsörnar verkligen griper sitt byte i flykten. Den lyckade jakten ovan torde närmast få betraktas som en slump, och det är föga troligt, att det rörde sig om någon form av samjagande efter ett viast «system».

KARL LENNART NILSSON

**S u m m a r y:** *An observation of a White-tailed Eagle (*Haliaeetus albicilla*) catching a prey in flight.* On January 6th 1961 two White-tailed Eagles were seen circling over Lake Sövdesjön, Scania. Alarmed by their presence several flocks of Mallards (*Anas platyrhynchos*) and Teals (*Anas crecca*) took flight passing close to the eagles. At the same time the numerous (300—400) Goosanders (*Mergus merganser*) on the lake remained on the water only gathering somewhat closer. The eagles paid no attention to the Goosanders. Instead one of them made an unsuccessful attack on a flying flock of Mallards. Later a single Mallard escaping from the attack of one of the eagles, was caught by the other one.

### 2. Bastarder mellan grågås och kanadagås i Västmanland

Skanssjön i Hallstahammar, Västmanland, en utvidgning av Strömsholms kanal, har blivit ett intressant fågelreservat, där det finns gräsänder, knölsvanar, skrattmåsar och kanadagäss, den sistnämnda arten om hösten i stora flockar.


När jag den 24.9.1961 gick omkring vid sjön, fanns det massor av kanadagäss där. Plötsligt fick jag syn på ett ex. som hade ljusröd näbb. Jag gick närmare och kunde då se att den hade köttfärgade ben. Som andra kanadagäss har svarta ben och svart näbb, undrade jag vad det kunde vara. Den avvikande gäsen hade rödaktig näbb med svart spets, ett vitt band löpte runt näbbroten och vidare hade den ett smalt vitt streck under ögat. Den vita kindfläcken var mindre välutvecklad än hos en typisk

87376

kanadagås. Halsen var mera brun än svart, och de för *Anser*-arterna karakteristiska halsfjädrarna, som ser ut att vara »vattenkammade» fanns på denna fågel. Med hänsyn till dessa olika fakta slöt jag, att det var en bastard mellan grågås (*Anser anser*) och kanadagås (*Branta canadensis*). Denna dag såg jag två sådana bastarder.

Senare på dagen kom jag åter till platsen. På stranden stod tillsammans en grå- och en kanadagås, och runt om dem sammade fyra bastarder. Nästa dag låg samtliga bastarder, tillsammans med de övriga kanadagåssen, på andra sidan sjön. Följande dag igen hade jag turen att kunna fotografera en av bastarderna invid stranden.

HANS BORG



Bastardexemplar av grågås × kanadagås (*Anser anser* × *Branta canadensis*).  
Foto: HANS BORG.

**Redaktionell kommentar:** Kanadagåsen håller som bekant på att sprida sig i landet och det gäller att noggrant följa förloppet. Givetvis är det av största vetenskapliga intresse att studera hur en ny art anpassar sig till den svenska miljön, vilka biotoper den besätter och, inte minst, dess relation till andra djurarter. För den skull är ovanstående rapport om bastardisering mellan grå- och kanadagås i halvvitt tillstånd av stort intresse. Enligt BJÖRN NILSSON, som påbörjat en undersökning av

306

kanadagåsens ekologi i Blidö kända från djurparkar (a dugliga eller ej, är dock i insända alla notiser, som beteende gentemot människor etc.).

**Summary:** Hybrid geese between gray goose (*Anser anser*) and Canada goose (*Branta canadensis*). They had flesh more brown than black.

### 3. Ny häckningslok

Vid ett besök vid sjön Islinger togs 6 svarthakedoppingar verandes ytterligare ett bo

Den 11.6. sågs 4 par svartakade hankar. Dessutom iakttoogs minst 3, varför inte mindre än 6. Sjön är omgiven dels av gungflytade sankmarkar. Häckning av svarthake i Jönköpings län, och har

ÅL

**Summary:** New nesting place at Lake Islinger in Småland. Four broods (of 6) were watched at Lake Islinger.

### 4. Sandtärnor

Den 27.6.1961 observerades 2 sandtärnor i Ångarnas naturreservat i Malevikens norra del. De var vilaende på en storleksskillnaden tydligt i närheten. Härvid lades småningom avancerade frukter. Nu kunde i kikaren (10 x) se korta, kraftiga, helsvarta mardräkt utan minsta vitfläck.

Efter några minuter lyftes och hälsades därvid med

ska  
syn  
och  
och  
liga  
nde  
  
g

kanadagåsens ekologi i Blekinge, är bastarder mellan ifrågavarande två arter tidigare kända från djurparkar (alltså i inhägnade dammar o.dyl.). Om bastarderna är könsdugliga eller ej, är dock inte känt. — VF:s läsare uppmanas livligt att till tidskriften insända alla notiser, som kan belysa kanadagåsens häcknings- och övervintringsvanor, beteende gentemot människan och gentemot fåglar och andra djur, häckningsresultat etc.

S. U.

**Summary:** Hybrid between Grey Lag Goose and Canada Goose in the province of Västmanland. Four free-living specimens of the hybrid between *Anser anser* and *Branta canadensis* were seen on Lake Skanssjön at Hallstahammar ( $59^{\circ} 37' N$ ,  $16^{\circ} 12' E$ ). They had flesh-coloured legs and a pink bill with black nail. The neck was more brown than black and it was furrowed in the manner typical of *Anser* species.

### 3. Ny häckningslokal för svarthakedopping (*Podiceps auritus*) i Småland

Vid ett besök vid sjön Islingen i Frinnaryds sn, Jönköpings län, den 11.5.1961 iaktogs 6 svarthakedoppingar. Den 14.5. gjordes det första bofyndet, och den 22.5. observerades ytterligare ett bo.

Den 11.6. sågs 4 par svarthakedoppingar med var sin kull dunungar på klarvattnet. Dessutom iakttoqs minst ett ad. ex. Antalet ungar i de olika kullarna var 5, 4, 3 och 3, varför inte mindre än 24 svarthakedoppingar uppehöll sig i sjön samtidigt.

Sjön är omgiven dels av barrskog, uppbländad med björk, al och videarter, dels av gungflyartade sankmarker. Den är till stora delar bevuxen med starr, säv och vass.

Häckning av svarthakedopping har tidigare rapporterats endast från ett par lokaler i Jönköpings län, och har då bara gällt något enstaka par.

ALVAR GUSTAFSSON LENNART FRITZSON WILGOT FRITZSON  
CONNY CLAESSEN BENGT OHLSSON

**Summary:** New breeding locality of Horned Grebe in the province of Småland. Four broods (containing 5, 4, 3 and 3 chicks) of *Podiceps auritus* were watched at Lake Islingen ( $57^{\circ} 56' N$ ,  $14^{\circ} 52' E$ ) on June 11th 1961.

### 4. Sandtärnor (*Gelochelidon nilotica*) iakttagna nära Göteborg

Den 27.6.1961 observerades två sandtärnor i Malevik, ca 20 km S Göteborg.

Då jag på återväg från studier av sträckande vadare gick över de sanka strandängarna i Malevikens nordvästra inre del, upptäcktes på ett par hundra meters håll två tärnor vilande på ett par stenar i strandkanten. Redan på detta avstånd kunde storleksskillnaden tydligt urskiljas i jämförelse med några fisktärnor, som uppehöll sig i närheten. Härvid lades särskilt märke till de relativt högre benen. Jag kunde så småningom avancera fram till ca 50 m avstånd, innan fåglarna visade tecken till oro. Nu kunde i kikaren ( $10 \times 50$ ) utmärkt iakttagas sandtärnans främsta kännetecken, den korta, kraftiga, helsvarta näbben och de höga svarta benen. Fåglarna var ad. i sommardräkt utan minsta vita strimma i den svarta kalotten.

Efter några minuter lyfte den ena fågeln och flög de få meterna över till den andra och hälsades därvid med ett flerstävigt djupt skorrande (helt olikt den kentska tär-