

12. Smärre meddelanden

Tornuggla (*Tyto alba*). I VF 19 (1960): 244 redovisar RAGNAR EDBERG ett fynd av tornuggla från Näsby, Ås sn, S Öland. Från samma plats kan rapporteras ytterligare ett ex., vilket så sent som vid årsskiftet 1952/53 omkom på en höskulle nära f.d. Ottenby jvstn. Denna tornuggla förvaras i monterat skick och har av konservatorn bestämts till ad. hona.

WOLF JENNING

Härfågel (*Upupa epops*). Ett ex. sågs den 28.4. 1961 vid Häggdånger, ca 20 km S Hårnösand.

OLLE SÖDERSTRÖM

Ett ex. iaktogs den 6.9.1962 i Jakobsberg, ca 25 km från Stockholm. Fågeln kunde studeras under ca 30 min., då den i regnvädret spatserade omkring på min skogstomt och plockade kryp från marken.

GUDE GEDDA

Gråspett (*Picus canus*). Ett ex. sågs den 11.2.1962 vid Serri-verksamhetens renforskningsstation i Slakka, Jokkmokk, Lu Lpm. Stationen är belägen mitt emellan Stora och Lilla Lule älv, ca 5 km N polcirkeln.

SVEN PERSSON

Sommargylling (*Oriolus oriolus*). Ett ex. sågs 16.-18.6.1962 i Askövikens närhet, Vstm.

CARL HOLGER JOHANSSON

Svartkråka (*Corvus c. corone*). Den 1.3.1962 uppehöll sig 4 ex. på den steniga stranden N Visby tillsammans med ca 40 kråkor (*Corvus corone cornix*). Även den 16.3. och den 2.4.1962 iaktogs svartkråkor på denna plats.

Goda tillfällen till jämförelser med råka (*Corvus frugilegus*) gavs, då ett 30-tal ex., övervägande unga utan ljust vid näbbroten, uppehöll sig i Visby 1.1.-18.3.1962.

Svartkråkor har tidigare påträffats på Gotland vid tre tillfällen: i Klintehamn (jan. 1895), i Vamlingbo (nov. 1896) och i Akebäck (vintern 1913) enligt RENDAHL: Fågelboken, Stockholm 1949.

STIG HÖGSTRÖM

Råka (*Corvus frugilegus*). Enstaka ex. ses regelbundet varje år i april i Umeåtrakten.

JAN-ERIK MALMSTIGEN

Svart rødstjärt (*Phoenicurus ochruros*). Den 14.7.1962 sågs och hördes en ♂ vid järnvägsstationen i Örkelljunga, Skåne. Då mina föräldrar åter besökte lokalen några veckor senare sjöng fågeln fortfarande där. Dessutom sågs en orädd ungfågel på platsen.


STAFFAN JOHNSON

Rødhake (*Erithacus rubecula*). Den 6.2.1962 sågs två ex. längst ut på Sotenäset, Askums sn, Bohuslän. Lokalen saknar all vegetation.

GÖSTA NILSSON W. ÅNGERMARK

Gråshoppssångare (*Locustella naevia*). Ett ex. observerades mellan den 1.-16.7.1962 i en timotejvall 2 km S Bräkne-Hoby i Blekinge. Den sjöng mestadels från Rumex-plantor, som stack upp ovanför timotejen. Sångintensiteten den 5.7. återges i vidstående diagram. Temperaturen under observationsdygnet varierade mellan +8°-+18° C. Vindstyrkan översteg ej någon gång 7 m/sek. Dygnet enda nederbörd föll i form av en måttlig regnskur i dygnets sista timma, vilket kan förklara den låga sångintensiteten då.

INGE AXELSSON STURE AXELSSON



87893

Sångintensitet  
Bräkne-Hoby  
timma. A=  
24 hours on

En sjung  
höll sig här

Två sjung  
vik, Dlr.

Trast  
vid Triberg

Kärrs  
Öredal ca  
gjordes två  
nässelbestä  
detta har  
200 x 50 m  
omgivet av

Hökså  
den 31.5.15  
denna art.

Grans  
den, Romel