

Järnsparv (*Prunella modularis*). Ett bo med 5 ägg hittades i en enbuske, vid Kvarnåkerhamn, ca 5 km W Silte den 3.5. Detta torde utgöra det andra bofyndet av arten på Gotland.

Sädesärta (*Motacilla alba*). På en dynghöj intill Arla sågs ett ex. den 5.12. Under månadsskiftet november-december föll ca 1 dm snö, och temperaturen på natten var stundom -10°C .

Stenkneäck (*Coccothraustes coccothraustes*). Den 9.10. sågs 9 ex. i ett fruktträd inne i Visby.

Korsnäbb sp. (*Loxia curvirostra/pytyopsittacus*). Redan i mitten av juni började smärre sällskap visa sig. Under juli ökades antalet, och flockarnas storlek uppgick inte sällan till 100 ex. I augusti steg antalet ytterligare, för att i slutet av månaden och i början av september kulminera med flockar på upp till 200 ex., främst på Tofta skjutfält.

BENGT LARSSON

Summary: Bird observations in Gotland in 1962. Among others, some data from the invasions of *Dendrocopos major* and *Loxia sp.* are given from a locality outside Visby. The invasion of *Dendrocopos major* was noticed first in the beginning of August, and later during the autumn the species was seen in large numbers. In the middle of June small flocks of *Loxia curvirostra/pytyopsittacus* were seen. During July the number increased, and flocks of 100 specimens were often noticed. During August the number of Crossbills still increased and culminated at the end of August and the beginning of September, when flocks of up to 200 specimens were seen. On September 16th large numbers of *Parus ater* were seen on migration southwards at Västergarn ($57^{\circ}26'N$, $18^{\circ}9'E$). The flocks contained up to 50 specimens, mostly only *P. ater*, but sometimes also *P. major* had joined the flocks. — In addition, the second breeding-report of *Prunella modularis* in Gotland is given, as well as some occasional records of i.a. *Porzana parva*, *Streptopelia turtur*, *Corvus c. corone*, *Parus cristatus* (first record in Gotland), *Phylloscopus trochiloides* and *Ficedula parva*.

14. Smärre meddelanden

Islom (*Gavia immer*). Ett ex. upptäcktes den 24.7.1960 i sjön Råsvälen, Västmanland. Fågeln kvarstannade till den 3.8.1960.

OLA ALMKVIST

Vitnäbbad islom (*Gavia adamsii*). Den 2.8.1962 påträffades ett kranium av vitnäbbad islom i Åsa, Halland (ca 50 km S Göteborg). Efter ivrigt sökande påträffades även en bål den 11.11.1962, som senare bestämdes till vitnäbbad islom av intendent J. LEPIKSAAR på Naturhistoriska Muséet i Göteborg. Då bälens fyndplats endast låg ca 200 m. från kraniets torde de båda fynden härröra från en och samma fågel. Vissa osteologiska mått redovisas här: Underkäkslängd utan näbbslida 170,2 mm. Underkäkslängd med påsittande näbbslida 180,0 mm. Postorbitala bredden 47,0 mm. Temporal bredden 44,0 mm. Praeorbitala bredden 29,2 mm. LENNART LYBERG

Gråhakedopping (*Podiceps griseigena*). Två ex. i vinterdräkt sågs den 6.1.1961 i Habybukten, S Sotehuvud, Bohuslän. Medobservatörer var GUNNAR ANDERSSON och JAN SONDELL. Den 7.1.1961 observerades ytterligare ett ex. i Kragenäsfjorden, Boh.

ROGER GYLLIN HANS KÄLLANDER