

Gräshoppsångare (*Locustella naevia*) förekommer sparsamt på lämpliga lokaler.

Rörsångare (*Acrocephalus scirpaceus*) förekommer tämligen allmänt på lämpliga lokaler.

Gulsångare (*Hippolais icterina*). Våren 1964 var arten ovanligt talrik. Sälunda sjöng ett 20-tal ex. fördelade på två begränsade lokaler, och dessutom sjöng spridda ex. på lämpliga biotoper.

Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*). Under 1963 iakttoogs 6 utfärgade ♂♂. Två bon hittades. År 1964 sjöng minst 4 icke utfärgade ♂♂ och 6 utfärgade ♂♂, något bo hittades ej, men häckning synes mycket sannolik.

Tallbit (*Pinicola enucleator*). Den 20.1.1963 iakttoogs 4 ♂♂ och 3 ♀♀ efter gamla Långnäsvägen, Hofors, (BA, LR). Ytterligare 1 ♂ sågs där den 3.3.1963, (LR). I ett par tallar mitt inne i Hofors samhälle observerades den 22.1.1963 3 ♂♂ och 2 ♀♀ (BA, CEE). Under senare hälften av december månad 1964 sågs som mest 60 – 70 ex. i Hofors samhälle. I Kalvsnäs Torsåker sågs 5 ex. sträcka mot NW den 26.12.1964 (CEE).

Videsparv (*Emberiza rustica*). 1 ex. iakttoogs på ett kalhygge vid sjön Långsjön, Hofors, den 27.8.1963 (BA, LR).

Snösparv (*Plectrophenax nivalis*). På ett fält 7 km väst om Hofors sågs den 25.1.1964 ca 120 ex. (BA, LR).

BJÖRN ANDERSSON

CARL-ERIK EKMAN

LENNART RISBERG

Summary: Bird records from W. Gästrikland (approx. 60°30'N. lat.) 1962–64. Breeding records of *Picoides tridactylus* and *Cinclus cinclus*. Several observations of *Dendrocopos leucotos*, *Hippolais icterina*, *Carpodacus erythrinus* and others.

3. Fågelrapport från Närke 1964

Som grund för denna rapport ligger ett upprop, som utsänts till alla SOF-medlemmar i Närke. Uppropet innehåller bl.a. förfrågningar om vissa arters uppträdande och nedan refereras till detta.

S m å l o m (*Gavia stellata*). Endast 1 häckning fastslagen i landskapet 1964 var till kommer 2 sannolika (LA). Jfr VF 24:277.

S m å d o p p i n g (*Podiceps ruficollis*). 1 ex. hävdade revir i Fågelsjön, Kvismaren 1.–18.6. (JP, CR, BT, UT). 1 fågel fångades oskadd i en katsa i Segersjöviken, Storhjälmaren, 16.5. och frigavs (EW). På samma lokal sågs 1–2 ex. 23.8.–27.9. (RE, UH, GN, RS).

B erg a n d (*Aythya marila*). Trots en kraftigt tilltagande fältornitologisk aktivitet kring Hjälmaren observeras numera denna art mycket sällan. Under året föreligger endast 4 observationer, 2 från Hjälmaren och 2 från Letälven på gränsen till Värmland, alla från oktober och november.

A l f å g e l (*Clangula hyemalis*). Uppträder fåtaligt men årsvisst i Närke, 1964 gjordes 2 vår- och 1 höstobservation.

S v ä r t a (*Melanitta*) om 6 ex. i Mellanjärde Storhjälmaren 2 novem-

E j d e r (*Somateria*) maren, 14.4. (UH, BT)

S t o r s k r a k e (*M* Södermanlandsdelen) 8. fastställas till ca 8000 e-

S a l s k r a k e (*M* bl.a. Tysslingen och O i Segersjöviken, Storhj 15.11. med 30 ex., var i samma månad (RE, maren 25.10. (ST).

G r a v a n d (*Tador*) **P r u t g å s** (*Branta*) **O r m v r å k** (*Buteo*) med bl.a. 4 fjällvråkar på lång tid kända öve 24:278 omnämnda fåge följande vintersäsongen mossen i Västernärke

D u v h ö k (*Accipit*) fiskgjusebestånd har i främst genom förfragni talet häckande par av

H a v s ö r n (*Halie*) känd i Närke 1963–64 terades sannolikt 4 olj sedd regelbundet på St minstone fram till islä

B l å k ä r r h ö k (*C* fågel i Närke 1964. Till vintrade vid Kvismare

P i l g r i m s f a l k (*markerade revir vid sa föra en lyckad häckni*

A f t o n f a l k (*Fal* 2.–12.6. (HC, BeS, L

O r r e (*Lyrurus tet* närl. En rapportör sk marsch. I det med ot landet öster om Skage märks på orlekarna rapporter om ökning i

S v ä r t a (*Melanitta fusca*). Sammanlagt 4 observationer; 18.5. noterades en flock om 6 ex. i Mellanfjärden, Hjälmaren (NÄN) och 6.12. 1 ex. i Sjömosjön (NÄN). På Storhjälmaren 2 novemberfynd, 1 ex. den 1. (TÖ) och 3 ex. den 8. (GN, OP, RS, BT).

E j d e r (*Somateria mollissima*). 1 guding sågs i en vak i södra Essundet, Hjälmaren, 14.4. (UH, BT) och sannolikt samma fågel också 19.4. (KJ).

S t o r s k r a k e (*Mergus merganser*). Vid en inventering av Hjälmaren (inkl. Södermanlandsdelen) 8.11. kunde med hjälp av bil, båt och flyg sjöns skrakbestånd fastställas till ca 8000 ex. (JS m.fl.).

S a l s k r a k e (*Mergus albellus*). Sågs som vanligt färligt under vårsträcket vid bl.a. Tysslingen och Oset (UH m.fl.). På hösten har arten en betydande rastlokal i Segersjöviken, Storhjälmaren. 1964 sågs de första 2 ex., 6.9. Antalet kulminerade 15.11. med 30 ex., varav 3 utfärgade hanar, och de sista, 5 ex., observerades den 22. i samma månad (RE, JG, GN, OP). Dessutom 9 ex. vid Finnhammaren, Storhjälmaren 25.10. (ST).

G r a v a n d (*Tadorna tadorna*). 1 ex. rastade vid Oset 15.5. (CR, ST).

P r u t g å s (*Branta bernicla*). 1 rastande fågel vid Oset 16.–25.10. (UH, KL).

O r m v r å k (*Buteo buteo*). 1 ex. genomförde 1963–64 i Kvismaren tillsammans med bl.a. 4 fjällvråkar (*Buteo lagopus*) och 2 kungsörnar (*Aquila chrysaetos*) den första på lång tid kända övervintringen av arten i landskapet (RE, BT m.fl.). Den i VF 24:278 omnämnda fågeln vid Oset stannade till 30.1. (BS, BT m.fl.). Även från den följande vintersäsongen föreligger ett anmärkningsvärt sent fynd, 1 ex. vid Gåssjömossen i Västernärke 29.12. (AL).

D u v h ö k (*Accipiter gentilis*). I samband med en inventering av landskapets fiskgjusebestånd har i möjligaste mån också förekomsten av duvhök utforskats, främst genom förfrågningar hos större markägare. Härigenom har framgått, att antalet häckande par av duvhök i Närke båst beskrivs med ett ensiffrigt tal (JS).

H a v s ö r n (*Haliaeetus albicilla*). Ingen genomförd övervintring med säkerhet känd i Närke 1963–64. 1 ex. sågs dock 24.1. på Storhjälmaren. På vårsträcket noterades sannolikt 4 olika fåglar under tiden 27.3.–14.4. på olika platser. På hösten sedd regelbundet på Storhjälmaren från 31.10. med 1–2 ex., 1.11. sannolikt 3 ex., åtminstone fram till isläggningen. Dessutom 1 ex. vid Tysslingen 9.11.

B l å k ä r r h ö k (*Circus cyaneus*). Liksom 1963 uteblev blå kärrhöken som häckfågel i Närke 1964. Tillfälligt sågs dock såväl hane som hona. (Kv.fstn.). 1 hane övervintrade vid Kvismaren 1963–64 (BT).

P i l g r i m s f a l k (*Falco peregrinus*). Ett enda par fanns i landskapet 1964 och markerade revir vid samma fiskgjusebo som 1962. Paret synes oförmöget att genomföra en lyckad häckning (JS).

A f t o n f a l k (*Falco vespertinus*). 1 ex. uppehöll sig i Hidingeby, Västernärke 2.–12.6. (HC, BeS, LS, BT m.fl.).

O r r e (*Lyrurus tetrix*). Arten synes ha ökat rätt påtagligt, åtminstone i Västernärke. En rapportör skriver: »Orren har under senaste decenniet varit stadd på frammarsch. I det med otaliga mossar, fallhyggen och hagmarker genombrutna skogslandet öster om Skagern har denna ökning varit särskilt märkbar. Detta har också märkts på orrekarna om våren» (LA). Även från närmast föregående år föreligger rapporter om ökning av orre, bl.a. från Villingsbergs skjutfält.

V a k t e l (*Coturnix coturnix*). Uppträdde ovanligt talrikt i juni-juli över hela landskapet. Första iakttagelsen gjordes 6.6. och tämligen regelbundet hördes sedan vaktlar ca två veckor in i juli. Dessutom 1 släende fågel så sent som 1.8. Inalles inräknades ca 15 ex.

K o r n k n a r r (*Crex crex*). Medan antalet kornknarrar var ovanligt lågt i östra Närke, där, inkl. Kvismaren, endast 4 ex. inräknades (Kv.fstn., JG, OP m.fl.) rapporterades ett gott år från Västernärke med närmare 10 ex. hörda (RO).

S t r a n d s k a t a (*Haematopus ostralegus*). 1 par sågs i april-maj vid Letälvens utlopp i Skagern och häckning konstaterades senare på sjöns Värmlandsida (LA). I Storhjälmaren sågs 1 par under juni och den första häckningen i landskapet fastslag så småningom på den lilla ön Ramberget (KB). Uppträdde f.ö. i normal omfattning under sträcktiderna och sågs 12 olika dagar; största flocken, 6 ex., noterades vid Oset 30.8.

R o s k a r l (*Arenaria interpres*). 4 observationer av rastande fåglar från höststräcket, 2 vid Oset och 2 på Storhjälmaren.

R ö d s p o v (*Limosa limosa*). Flera observationer i april-maj vid såväl Oset som Kvismaren. På den senare lokalen genomfördes häckning och i slutet av juni iakttopt 2 ad. och 3 juv. (JG, CR, BS, ST).

S m å s n ä p p a (*Calidris minuta*). Småsnäppan ses ytterst sällan i inlandet under vårsträcket, och den enda lokal i Närke där den är iakttagen denna årtid är Oset, där första vårobservationen gjordes 1960. 1964 rastade 1 ex. 18.5. (CR).

S a n d l ö p a r e (*Crocethia alba*). 3 ex. rastade på Grundholmarna i Storhjälmaren 19.-20.9. (NÄN). Detta är fjärde fyndet i landskapet; de tre tidigare är alla gjorda vid Oset.

S m a l n å b b a d s i m s n ä p p a (*Phalaropus lobatus*). 2 ex. rastade vid reningsverket, Asker 31.5.-1.6. (BE-S, KS) och 1 ex. i Fågelsjön, Kvismaren 2.6. (Kv.fstn.). Från höststräcket föreligger 2 observationer; 1 ex. vid Oset 13.7. (TL) och 1 ex. i Fågelsjön, Kvismaren 20.8. (OP, UT).

L a b b (*Stercorarius parasiticus*). Vid middagstiden 20.9. kom 1 gammal labb av ljus fas flygande på måttlig höjd från öster förbi Finnhammaren över Storhjälmaren. Labben fortsatte i lugn och jämn flykt västerut över sjön utan att ta någon notis om övriga fåglar (RG, BT).

H a v s t r u t (*Larus marinus*). Ses numera åtminstone höstetid vid praktiskt taget varje besök på Storhjälmaren. Förekommer även regelbundet vid t.ex. Oset, där 1964 10 olika observationer gjordes.

D v ä r g m å s (*Larus minutus*). 1 ex. iakttopt över skrattmåskolonin i Egbyviken, Storhjälmaren 16.5. (IH). Vid Sottern noterades 28.6. 1 fjolösunge, som fiskade till sammans med en smärre flock skrattmåsar och fisktärnor (BT). Dessutom 1 juv. över Storhjälmaren 6.9. (EN).

S v a r t t ä r n a (*Chlidonias nigra*). 2 ex. vid Oset 25.6.-11.7. utgör första iakttagelsen på denna lokal sedan 1951 (RG, BT m.fl.). Dessutom föreligger 3 observationer från Storhjälmaren; 1 ex. 21.6. (CR), 1 ex. 18.7. (JP) och 2 ex. 8.9. (EN, US).

S i l v e r t ä r n a (*Sterna paradisea*). Ehuru arten torde sträcka över landskapet inte så fataligt, är de med säkerhet artbestämda individerna inte många och fisktärnorna (*S. hirundo*) är under alla omständigheter i mycket klar majoritet. 1964 gjordes 1 säker observation av silvertärna, 3 ex. vid Oset 5.9. (CR, BT).

En höku
1964-65,
Bo THYSE
during late

S m å t ä
ande in frå
Svartämyn

H ö k u
Lillkyrka
upptäcktes
1 ex. sågs
december 1



En hökuggla (*Surnia ulula*) uppehöll sig vid Kvarntorp större delen av vintern 1964–65, och under senhösten sågs flera exemplar på andra ställen i Närke. Foto: Bo THYSELIUS. (The Hawk-Owl occurred at different places in the province of Närke during late autumn and winter 1964–65.)

S m å t ä r n a (*Sterna albifrons*). I kraftig motvind kom 29.6. 3 gamla fåglar sträckande in från Hjälmmaren mot Oset. De försvann utan nämnvärd tvekan västerut över Svartämynningen och drog sannolikt vidare in över land (RG). Arten är ny för Närke.

H ö k u g g l a (*Surnia ulula*). 4 senhöftfynd har inrapporterats. 1 ex. sågs vid Lillkyrka norr om Hjälmmaren 8.11. (KB, HC, LS m.fl.). Vid Norrhult i Västernärke upptäcktes 1 hökuggla 22.11., vilken stannade på platsen en månad, och ytterligare 1 ex. sågs i Fjugesta 6.12. (RO). 1 ex. uppehöll sig vid Kvarntorp från mitten av december till omkr. 20.2. 1965 (DL, CR, BT m.fl.).

Sparvuggla (*Glaucidium passerinum*). Arten uppträdde såsom omnämnts i VF 24:279–289, invasionsartat i Närke hösten 1963 och sågs på de mest oväntade ställen. Detta tycks inte ha påverkat den häckande stammen vare sig i negativ eller positiv riktning, utan antalet på våren 1964 förefaller, så långt man kan uttala sig om denna »svåra» art, ha varit ungefär normalt (RO m.fl.).

Pärluggla (*Aegolius funereus*). På hösten 1964 flyttade pärlugglan invasionsartat söderut och fångades i stort antal vid kustfågelstationerna. Arten är emellertid extremt svår att i dylika sammanhang få grepp om i ett skogsrikt inland och endast 2 senhöftfynd från icke-häckplatser föreligger; 1 ex. på Hästnässudden på norra Hjälmarstranden 8.11. (JS) och 1 ex. som hittades sittande i en altopp mitt på dagen den 17. i samma månad vid Kåvö (ST). Med anledning av den stora höstutflyttningen ombuds rapportörerna meddela hur förhållandena varit på häckplatserna under våren 1964 och svaren är entydiga. Nedan följer några rapporter: »Har gått tillbaka jämfört med 1963» (AL). »Har ej ens hört pärlugglan under våren, än mindre känt till någon häckning trots att jag patrullerat av stora delar av västra Kilsbergen (LA). »Trots flera kvällsexkursioner till Ramsjön i norra Kilsbergen under vårvintern har inga pärlugglor hörts» (UH). »På de uggleinventeringar som företogs av Västernärkes Naturvårdsförening i februari–mars i södra och centrala delarna av Kilsbergen kunde endast 5 ex. noteras, en väldig minskning jämfört med 1963» (RO). »Vid ett område i och norr om Garphytte nationalpark där pärlugglan tidigare är aldrig uteblivit kunde 1964 inget höras av arten» (RG). Möjligen har dock tillgången på pärlugglor varit proportionvis större i sydöstra delen av landskapet på gränsen mot Södermanland där flera ex. hörts.

Kungsfiskare (*Alcedo atthis*). Arten förefaller ännu ej ha hämtat sig från den stränga vintern 1962–63 och endast 2 observationer är kända, båda i september.

Härfågel (*Upupa epops*). 1 ex. uppehöll sig vid Hidingsta sista augustiveckan. (DL m.fl.).

Vitryggig hackspett (*Dendrocopos leucotos*). Uppehöll sig under häckningstiden på samma lokal i Kilsbergen som föregående år (se VF 24:280). Dessutom 1 hona vid Segersjö på södra Hjälmarstranden 20.3.–12.4. (UH, GN, EW) samt 1 ex. vid Åby 29.2. (TH).

Trädlärka (*Lullula arborea*). Förekommer numera ytterst sporadiskt i Närke och flertalet rapportörer ser inte arten årligen. Ett anmärkningsvärt undantag utgör trakterna öster om Skagern i sydvästra Närke. Trädlärkan har här besatt en ny biotop och börjat häcka i de väldiga jordgubbsodlingarna, där 6 par häckade inom ett 5×2,5 km stort område. Inalles hittades 8 bon. Två kullar tycks vara regel, 5 ägg i första och 3–4 i andra. 15 ungar fördelade på 4 kullar ringmärktes. Inget fall av misslyckad häckning är känt, trots att tidpunkten för andra kullen sammansfaller med den hektiska skördetiden på jordgubbarna, då mängder av folk håller till i odlingarna hela dagarna (LA).

Snöskata (*Turdus pilaris*) och **taltrast** (*T. philomelos*). Från hela landskapet rapporteras ett ovanligt talrikt uppträdande av snöskata under hösten och förvintern. Vid Kvismaren uppehöll sig sälunda hela hösten stora flockar av denna art; antalet var i oktober och början av november vissa dagar fyrsiffrigt och ännu

27.11. inräkna
ande mängde
till 350 ex.
rapporterade
träddes arten
inne i Öreb
rönalléerna
till att snösl
talrika upp
så sags t.ex.
BS) och 1 e.

Ringtr
gjordes 5 ot

Svart
söder i Öre
noterades ha
svarta rödst
på 3 vänin
lades 5 ägg
sultat trots
lämnade de
lingen 19.4

Grash
Kvismaren.
det dubbla

Rödst

Varfå
Liknande s

Svart
brottet 28.

Rosen
der häckni
ringmärkte

Tallb
år och för
december.

Bergf
trakterna
inga bevis
LA=LENN
STAM, LC=
JG=JAN
QVIST, UF
Kv.fstn.=

unnts i
äntade
iv eller
ala sig

assions-
slertid
endast
i Hjal-
dagen
ningen
under
illbaka
e känt
bergen
intern
Jäster-
bergen
tid ett
ig ute-
i pärl-
n mot

g från
söder.
eckan.

häck-
sutom
samst

Närke
utgör
en ny
inom
gel, 5
et fall
ifäller
i od-

land-
i och
lenna
änna

27.11. inräknades 750 ex. Under december minskade snöskatorna men fanns i betydande mängder ännu vid jultiden (JS, BT, ST). Vid Lillån norr om Örebro sågs upp till 350 ex. långt in i december (ST). Från Glanshammar norr om Hjälmmaren inrapporterades stora flockar, främst i slutet av oktober (LC), och i Västernärke uppträdde arten i mycket stora flockar, vilka kalasade på rönnbären (RO). Även mitt inne i Örebro kunde flockar om uppemot 300 ex. ses, vilka främst frekventerade rönnalléerna (BT). Den rika rönnbärstillgången torde ha varit främsta anledningen till att snöskatorna dröjde sig kvar i sådan mängd. I samband med snöskatornas talrika uppträdande fanns också taltrast i viss omfattning kvar längre än vanligt. Så sågs t.ex. 1 ex. vid Oset 21.11. (UH), 1 ex. vid Karsjön i Käglan 6.12. (UH, CR, BS) och 1 ex. i Kvismaren 20.12. (BT).

Ringtrast (*Turdus torquatus*). Fatalig men årsvis under vårsträcket. 1964 gjordes 5 observationer av ensamma fåglar i april.

Svart rödstjärt (*Phoenicurus ochruros*). 1 par häckade på ett bygge på söder i Örebro. Hanen anlände 26.4. Honan kom tre dagar senare och samma dag noterades hanen sjungande för första gången. Efter bortovaro 2.-25.5. återkom det svarta rödstjärtparet och honan började genast bobygge. Hon byggde i 6 ventilhål på 3 våningar och föreföll helt villrädig. 5 av ventilerna stängdes då och omsider lades 5 ägg, varav 1 rötägg, i den sjätte. Häckningen genomfördes med lyckat resultat trots att periodvis mängder med arbetare uppehöll sig kring boet. De 4 ungarna lämnade detta 10. och 11.7. (SW). Dessutom 1 ex. i en vedstapel vid Gräve, Tysslingen 19.4. (K-AE).

Gräshoppsångare (*Locustella naevia*). Arten hade änyo ett gott år vid Kvismaren. 22 ex. ringmärktes, men antalet sjungande hanar torde ha närmat sig det dubbla (Kv. fstn.).

Rödstrupig piplärka (*Anthus cervinus*). 1 ex. sågs vid Oset 18.5. (TS).

Varfågel (*Lanius excubitor*). 7.8. sågs höstens första varfågel vid Kvismaren. Liknande sommarobservationer har gjorts två gånger tidigare under 1960-talet.

Svartpannad törnskata (*Lanius minor*). 1 ex. noterades vid Hällabrottet 28.6.-1.7. (SB, BT, UT m.fl.). Detta är andra fyndet av arten i Närke.

Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*). Detta är noterades inga rosenfinkar under häckningstid. 1 årsunge fångades på övernattningsplats vid Hidingsta 7.8. och ringmärktes (HJ, CR).

Tallbit (*Pinicola enucleator*). Ströbservationer av arten görs nästan varje år och för 1964 har 5 iakttagelser inrapporterats; 1 i februari, 1 i november och 3 i december. I samtliga fall har det rört sig om 2-6 ex.

Bergfink (*Fringilla montifringilla*). Denna art dröjde sig kvar i Kilsbergsatrakterna på försommaren och har uppenbarligen häckat på flera lokaler, eftersom bevis i form av bofynd föreligger (LA).

LA=LENNART AHLÉN, SB=STIG BLADE, KB=KNUT BORG, HC=HÅKAN CARLSTAM, LC=LENNART CARLSSON, KAE=KARL-AXEL ERIKSSON, RE=RUNE ERIKSSON, JG=JAN GUNNARSSON, RG=ROGER GYLLEN, TH=TORE HANSON, IH=IVAR HEDQVIST, UH=ULF HEMDAL, HJ=HÅKAN JOHANNESSON, KJ=KJELL JOHANSSON, Kv.fstn.=Kvismare fågelfstation, AL=ARNOLD LARSSON, KL=KENT LARSSON, TL=

TORD LARSSON, DL=DAVID LUNDEGÅRD, EN=EINAR NILSSON, GN=GUNNAR NILSSON, NÄN=NILS-ÅKE NILSSON, RO=RUNE OLSSON, JP=JAN PETTERSSON, OP=Ove PETTERSSON CR=CAJ RUNESSON, LS=LENNART SAMZELIUS, B-E=BENGT-ERIK SJÖLINDER, JS=JAN SONDELL, RS=ROLAND STRÖM, TS=TORBJÖRN STÄRNER, BEB=BERTIL SVENSSON, BS=BO SVENSSON, KS=KRISTER SÖLVELING, US=ULF SÖRLING, ST=STEFAN THORSELL, BT=BO THYSELIUS, UT=URBAN TORESSON, SW=SIGVARD WALLIN, EW=ELIS WINBERG, TÖ=THOMAS ÖBERG

Under de
vara gäss.
Stripgås-
troligen rö-
här.

Närkes Ornitologiska Förening
genom
ROGER GYLLEN KENT LARSSON

S u m m
of Gästril
September
have escaj

Summary: Bird report from the province of Närke, Central Sweden, in 1964. Wintering *Buteo buteo*, *Buteo lagopus*, *Aquila chrysaetos* and *Circus cyaneus* at Lake Kvismaren in 1963–64. The only pair of *Falco peregrinus* in the province seems incapable of breeding. As in 1963 there was no breeding of *Circus cyaneus*. Fewer than 10 pairs *Accipiter gentilis* are estimated to breed. Increasing numbers of *Lyrurus tetrix*. *Coturnix coturnix* was unusually numerous and about 15 were recorded in June-August. *Sterna albifrons* was observed and *Haematopus ostralegus* was found breeding for the first time in the province. Several records of *Surnia ulula* in late autumn. Extremely few *Aegolius funereus* were breeding and in the autumn this species was observed on southward migration in southern Sweden. *Turdus pilaris* was seen in large numbers in October–December. *Limosa limosa* and *Phoenicurus ochruros* bred successfully. On November 8th, 8,000 *Mergus merganser* had gathered in Lake Hjälmmaren. Occasional records of *Somateria mollissima* on April 14th and probably the same male on April 19th, *Falco vespertinus* on June 2nd–12th, *Stercorarius parasiticus* on September 20th, *Crocethia alba* on September 19th–20th and of *Lanius minor* on June 28th–July 1st.

4. Två stripgäss (*Anser indicus*) iakttagna i västra Gästrikland

I kvällningen den 8.9.1964 anlände vi till Bysjön, Hästbo, Torsåker, ca 50 km WSW Gävle. Bysjön är en eutrof sjö i storlek omkr. 900 x 200 m, där bl.a. knölsvan (*Cygnus olor*) häckar. Omkringliggande sjöar är oligotrofa. Runt omkring Bysjön finns åkrar med bebyggelse.

På några åkrar intill sjön hade enligt uppgift två gäss av okänd art uppehållit sig hela dagen. Då vi kl. 18.30 kom fram till sjön, såga gässen flyga ca 150 m över sjön, vilken de senare fällde i. I skymningen lyckades vi se de två gässen i kikare 8 x 40 på omkr. 25–30 m avstånd. Det första intrycket vi fick av de två drygt gräsandstora gässen var, att de var förhållandevis ljusa. Näbben var skär, och när gässen gick upp på en sten, kunde vi se att benen hade samma färg. Mellan ögonen, över nacken gick ett mörkt band, och nedan detta band fanns ytterligare ett. På var sida av den mörka halsen fanns två med halsen längsgående vita band. I flykten sågs mörka bakre vingkanter.

Morgonen därpå den 9.9.1964 lyckades LARS-OLOV OLSÉN fotografera stripgässen från ca 20 m utan extra kamerautrustning. Detta var sista gången stripgässen iakttogs i Bysjön.