

GUNNAR EHRENBOOTH, GE-L=GUSTAV ENEHÅLL, KGE=KARL GUSTAV ERIXON, BF=BJÖRN FORSBERG, CF=CAY FLYDÉN, AG=ALF GRANATH, HG=HASSE GUSTAVSSON, AH=ANDERS HANSSON, GH=GUSTAF S. HJERTRÉN, MH=MORGAN HOFFLANDER, SH=STEN HOFFLING, BJ=BJÖRN JACOBSSON, L-PJ=LARS-PETER JANSSON, LK=LENNART KJELLBERG, FL=FOLKE LARSSON, L-EL=LARS-ERIK LARSSON, BM=BERNE MARTINSSON, EN=EVERT NYQVIST, GN=GUNNAR NYQUIST, EO=ERIK OLAUSSON, N-OO=NILS-OLOF OLSSON, UO=ULF OTTOSSON, BP=BJARNE PETERS-SON, BS=BENGT SONESSON, BS-R=BJÖRN STEFFNER, KS=KJELL STRÖMNER, LS=LENNART SVENSSON, LS-K=LENNART STENBÄCK, L-ES=LARS-ERIK SCHÜTT, UW=UNO WEIDERSTAM, LÅ=LENNART ÅRLANDER.

Rapportkommittéerna för Värmland  
genom

ULF T. CARLSSON    ULF OTTOSSON    LENNART ÅRLÉN

**Summary: Bird report from Värmland for 1966.** First records from this province of: *Gavia immer*, *Recurvirostra avosetta*, *Acrocephalus arundinaceus*, *A. palustris* and *Serinus serinus*.

The winter of 1965-66 was unusually cold with much snow. The severe weather decimated the wintering populations of Goldcrests (*Regulus regulus*) and Reed Buntings (*Emberiza schoeniclus*). In the middle of April there was another period of extremely cold weather which caused damage to the Lapwings (*Vanellus vanellus*).

Many records of *Streptopelia decaocto*, i.e. 30 individuals at Kristinehamn during December. Tengmalm's Owl (*Aegolius funereus*) bred in some parts of the province in comparatively great numbers. A large number of these owls bred noticeably late in the season with young leaving the nests late in August or early in September. About 30 reports of *Turdus torquatus* during the spring migration; only a few individuals observed during other years.

#### 6. Fågelrapport från Närke 1967

Rapportkommittén för Närke presenterar härmed sin tolfte årsrapport. Liksom tidigare år bygger rapporten på uppgifter, vilka sänts in av ett stort antal rapportörer som svar på ett upprop. Det insända materialet har med åren glädjande nog blivit allt rikare. Detta innebär dock att en betydande sovring måste ske i fråga om arturvalet för att årsrapporten skall kunna hållas inom rimliga gränser. Allt inkommet material finns emellertid arkiverat och registerfört, och hålls tillgängligt för envar som önskar ta del av det. Avsikten är att med utgångspunkt från det rikhaltiga materialet efterhand utarbeta översikter över olika arters förekomst i landskapet på det sätt som redan skett med vitryggig hackspett (*Dendrocopos leucotos*) och tretåig hackspett (*Picoides tridactylus*) i VF 26(1967):30-36 samt med vaktel (*Coturnix coturnix*) och kornknarr (*Crex crex*) i VF 27(1968):122-135.

Gråhakedopping (*Podiceps griseigena*). 1 ex. i Vibysjön 9.4. (SB, SL, PM). Smådopping (*Podiceps ruficollis*). Första iakttagelsen gjordes i Fågelsjön, Kvismaren av 1 ex. 29.4. (ÅP, UT). Maximalt noterades 5 ex. 2.6. (BR, ST). Häckning trolig men ej konstaterad. På hösten sågs 1 ex. i Segersjövikén, Hjälmarén 24.9. och 1 ex. i Aldammen, Asker 30.9.-8.10. (JG, OP, ÅP, UT).

87408

Storskarv (*Phalacrocorax carbo*). 2 ex. 21.10. och 1 ex. 22.10. vid ön Kalv i norra Vättern (BA, UA, CD, NES).

Rördrom (*Botaurus stellaris*). Arten uppträdde ovanligt talrikt på våren 1967. Ca 15 ex. hördes fördelade på Tysslingen (3), Kvismaren (3), Lången (1), Vibysjön (1) samt i de olika Hjälmarevikarna Oset (3), Norra Björksundet (2), Fröshammarsviken (1) och Segersjö (1). Ingen fullt säker häckning har konstaterats, men vid Oset gjordes under högsommaren flera observationer av rördrommar flygande med byte och åtminstone 1 par torde ha häckat (RN).

Svart stork (*Ciconia nigra*). 1 ex. uppehöll sig vid den nyinvigda och av landstingsmedel iordningställda fågelsjön vid Hasselfors 26.5.-27.6. (RO m.fl.). Över Öby kulle, Kvismaren sågs möjligen samma fågel 27.6. kretsande ta höjd och sedan försvinna mot S (CR m.fl.).

Snatterand (*Anas strepera*). Vid Kvismaren sågs från 8.4. 1 hane och från 22.4. 1 par under hela våren och sommaren. 5 ex. noterades 20.8. och 3 ex. 26.8. (KL, ÅP, ST, UT m.fl.). 1 ex. iaktogs vid Reningsdammen, Vretstorp 30.8. (JOS).

Bergand (*Aythya marila*). Efter en lång nedgångsperiod under 1930-1950-talen (Fauna och Flora 58(1963):1-17) befinner sig arten sakta på uppgång som sträckgäst i Närke. Under tiden 8.10.-12.11. gjordes sex observationer i Hjälmaren med den största flocken, 10 ex., vid Äspenåsa udde 12.11. (OP, UT).

Vigg (*Aythya fuligula*). En mycket markant ökning har på senare år noterats i Storchjälmaren under hösten. 1967 sågs vid Yxnäset upp till 600 ex. i oktober (LB m.fl.), medan maximisiffran nåddes 4.11. med 1 200 ex. (HJ, BR, ST). Flockar av denna storleksordning var tidigare helt okända i landskapet.

Knipa (*Bucephala clangula*). Häckar enl. SOF:s fågelförteckning, 5:e uppl., sparsamt vid skogssjöar i Närke. Arten har dock ökat kraftigt och får nu betraktas som allmän t.ex. i sjöarna på Käglan. Numera häckar den även i ren slättsjöbiotop såsom i Hjälmaren och Kvismaren (jfr Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1964 och 1965, sid. 25 resp. 41). Även höstetid ses arten talrikare än förr, bl.a. noterades en ren flock om 350 ex. vid Yxnäset, Storchjälmaren 10.9. (KL).

Alfågel (*Clangula hyemalis*). Förutom några höstfåglar i Hjälmaren och Vibysjön har 1 hane i sommarträkt setts i Reningsdammen, Vretstorp 23.6.-2.7. (SB, JOS) och troligen samma fågel i Aldammen, Asker 6.7. (OP, ÅP, UT).

Svårta (*Melanitta fusca*). 1 ex. i Fågelsjön, Kvismaren 19.8. (LL) och sannolikt samma ex. i Aldammen, Asker 22.8. (AZ). Dessutom en flock om 8 ex. vid Oset 21.10. (BM, KR).

Ejder (*Somateria mollissima*). 5 ex., 2 hanar+3 honor, i Vibysjön 16.4.-17.4. 1965 (SB, SL, RT).

Salskrake (*Mergus albellus*). Under våren sågs 1-4 ex. under tiden 1.3.-8.4. vid Oset, Kvismaren, Vibysjön, Segersjö, Teen och Sjömosjön. Liksom närmast föregående år betydligt talrikare på höststräcket, ehuru sedd på färre lokaler. Vid Oset sågs 1-3 ex. vid sju tillfällen 14.10.-12.11 samt 9 ex. 19.11. Vid Segersjö iaktogs arten regelbundet 10.9.-3.12. med maximisiffran 27 ex., 14 hanar+13 honor, sistnämnda dag.

Gravand (*Tadorna tadorna*). 1 ex. i Kvismaren 12.3.-27.3. (RE, HJ, KRS m.fl.). Dessutom 1 ex. i Vibysjön 25.7.1965 (RT).

Spetsbergsgås (*Anser brachyrhynchus*). 1 ex. i en flock sädgäss (A.

*jabalis*) i Kvismaren 17.3. (CS).

Vitkindad gås (*B* i en flock kanadagäss fågel (KL).

Brun glada (*Milv* över Uddgarn på norra H

Pilgrimsfalk (*Fa* förteckning, 5:e uppl., bör att ingen lyckad häcknin

Jaktfalk (*Falco ru* mars tid 26.11. (RN).

Aftonfalk (*Falco* Västernärke 23.6. (LJ, AM vid Oset 12.8. (KS).

Tornfalk (*Falco ti* med endast 1 häckning 1 har en viss ökning inträff total lokaler.

Rackelhane (*Tet* för orre (*Lyrurus tetri* som en orre, kanske någo framför allt näbben som som tjäders. Ögonbryn så oansenliga som hos tj

Rackelhanen, vilken 1 iakttagas under en halv tog ingen notis om de n riset (OP, ÅP, UT).

Dalripa (*Lagopus* att arten häckar sparsam bör pepekas, att inga f de senaste tio åren i N

Vaktel (*Coturnix* och 1 ex. vid Mullhytta av juni (AM, MR). 1 K 27.8. Antalet fåglar va utom 1 ex. vid Kilsmo

Småfläckig s i men sparsamt på någ Under två nätter i mit maren. På ytterligare arten mycket talrikt. 1 station i samband m under 1961-1966 trot samma förutsättninga

*jabalis*) i Kvismaren 17.3. (TL) och 4 ex. i en betande sädgåsflock vid Mosjön 9.4. (CS).

Vitkindad gås (*Branta leucopsis*). 2 ex. vid Oset 22.10. (DL, RN). 1 ex. i en flock kanadagåss (*B. canadensis*) vid Sjömosjön 2.12. var möjligen en parkfågel (KL).

Brun glada (*Milvus migrans*). 1 ex. sträckte 9.7. på måttlig höjd mot NE över Uddgarn på norra Hjälmarsstranden (EN). Tredje fyndet i Närke.

Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*). Med anledning av uppgiften i SOF:s fågel-förteckning, 5:e uppl., bör påpekas att arten ej längre häckar årsvisst i Närke och att ingen lyckad häckning är känd från 1960-talet.

Jaktfalk (*Falco rusticolus*). 1 ungfågel kunde studeras vid Oset i ett par timmars tid 26.11. (RN).

Aftonfalk (*Falco vespertinus*). Möjligen samma hane sågs vid Mullhyttan i Västernärke 23.6. (LJ, AM, RO, MR) och vid Tysslingen 25.6. (AM). Dessutom 1 hane vid Oset 12.8. (KS).

Tornfalk (*Falco tinnunculus*). Efter de mycket magra åren i decenniets början med endast 1 häckning känd 1962, 2 kända 1963 och på nytt endast 1 känd 1965 har en viss ökning inträffat. 1967 rapporterades tornfalk under häckningstid från ett tiotal lokaler.

Rackelhane (*Tetrao urogallus* x *Lyrurus tetrix*). 1 ex. sågs på en spelplats för orre (*Lyrurus tetrix*) på Himmersmossen i Östernärke 1.4. Utseende: Storlek som en orre, kanske något mindre och slankare. Huvudet påminde starkt om tjäderna, framför allt näbben som var kraftigare och gulare än orrens. Stjärten var rundad som tjäderna. Ögonbrynen var inte så svällande röda som hos orren men ej heller så oansenliga som hos tjäderna. Inget läte hördes.

Rackelhanen, vilken befann sig på en spelplats tillsammans med 4 orrar, kunde iakttagas under en halvtimmes tid från orrkoja på ett par meters håll. Rackelhanen tog ingen notis om de närvarande orrarna utan gick hela tiden och plockade i lingonriset (OP, AP, UT).

Dalripa (*Lagopus lagopus*). Då det i SOF:s fågelförteckning, 5:e uppl., anges att arten häckar sparsamt — tämligen allmänt från Värmland, Närke och Västmanland bör pekas, att inga fynd överhuvudtaget och ännu mindre några häckfynd gjorts de senaste tio åren i Närke.

Vaktel (*Coturnix coturnix*). I Västernärke noterades 1 ex. vid Västanby 29.5. och 1 ex. vid Mullhyttan 29.5.-31.5. (RO) samt troligen 2-3 ex. vid Tysslingen i början av juni (AM, MR). I Kvismaredalen hördes vaktlar på flera platser under tiden 22.5.-27.8. Antalet fåglar var dock ringa, sannolikt 3-4 ex. (JG, KL, OP, JOS m.fl.). Dessutom 1 ex. vid Kilsmo i sydöstra Närke 13.6. (AB).

Småfläckig sumphöna (*Porzana porzana*). Arten uppträder regelbundet men sparsamt på några lokaler men var under 1967 avgjort talrikare än normalt. Under två nätter i mitten av maj hördes minst 10 ex. i Tysslingen och 13 ex. i Kvismaren. På ytterligare ett tiotal lokaler hördes 1-5 fåglar. Även på förhösten förekom arten mycket talrikt. I mitten av augusti fångades av personalen vid Kvismare fågelstation i samband med vadarefångst 13 ex. jämfört med endast 5 ex. sammanlagt under 1961-1966 trots att ringmärkningen försiggick på samma lokaler och under samma förutsättningar som tidigare.

Rörhöna (*Gallinula chloropus*). Uppträdde framför allt vid Oset i osedvanligt stort antal på våren och försommaren och var klart talrikare än t.ex. sOTHÖNAN (*Fulica atra*).

Strandskata (*Haematopus ostralegus*). 1 par häckade på ön Kalv i norra Vättern såväl 1965 som 1967 med lyckat resultat. 1966 uppehöll sig 1 par hela sommaren på ön men blev troligen stört av militära skjutningar. Häckningsförsök av ytterligare 1 par 1967 gjordes troligen vid Dimmertorp 2 km S om Olshammar på nordvästra Vätterstranden; paret sågs från början av maj till andra juliveckan (BA, UA, CD, NES). Från sträcktiden föreligger ett 15-tal observationer, bl.a. sågs en ovanligt stor flock om 25 ex. vid Oset 12.8. (BR).

Roskarl (*Arenaria interpres*). Fem observationer gjordes under vårsträcket i maj och två under höststräcket i juli-augusti. Enligt SOF:s förteckning, 5:e uppl., är arten endast «funnen» i Närke men otvivelaktigt passerar ett regelbundet sträck landskapet.

Dubbelbeckasin (*Gallinago media*). 1 ex. hördes och sågs under fullt spel vid Oset på förmiddagen 14.5. (LB, CR). Arten har uppträtt vid Oset några gånger på senare år men spel har ej noterats sedan 1950.

Rödspov (*Limosa limosa*). 1 par i Kvismaren under våren och försommaren. I april sågs vid några tillfällen 3 ex. (KL, BT m.fl.). Ensamma fåglar uppträdde vid Oset 9.5. och 22.5.-23.5. (KL m.fl.) och vid Kvarntorp 13.8. (JP).

Sandlöpare (*Crocethia alba*). 1 ex. uppehöll sig längst ut på Klippflons udde på Närkossidan Letälven 31.7. (LA). Femte fyndet i Närke.

Skärfläcka (*Recurvirostra avosetta*). 3 ex. vid Oset 23.5. Fåglarna flög tvekan- över fågeludden men drog sedan iväg inåt Rynningeviken, där de tog höjd och sträckte västerut (KL, DL, ST m.fl.). Arten är ny för Närke.

Smalnäbbad simsnäppa (*Phalaropus lobatus*). Ensamma fåglar rastade vid Oset 27.5.-28.5. (LB, CR), 12.6. (DL) och 12.8. (BR).

Havstrut (*Larus marinus*). Första bofyndet i Hjälmaran och det andra i Närke gjordes då 1 bo med 2 ägg hittades på ön Sjuln nära Valen i Storbjälmaran 3.6. Troligen misslyckades häckningen, då den ena fågeln i paret hittades död strax intill boet (RG, BT m.fl.). Sannolikt har ytterligare ett par häckningar ägt rum i Storbjälmaran, då familjer om 2 ad. och 3 juv. setts vid Lunger i andra juliveckan (LJ, AM) och vid Valen 29.7. (ÖNF).

Dvärgmåsa (*Larus minutus*). 1 ungfågel över Fågelsjön, Kvismaren 27.5. (ST) och möjligen samma ex. i skrattmåskolonin i Ladviken, Oset 3.6. (CR).

Svarttärna (*Chlidonias nigra*). Vid Tysslingen sågs 1 ex. 13.5. (LB) och 3 ex. 31.5. (RG, BT). Vid Oset noterades 1 ex., säkerligen samma, 7.7. och 10.7. (BM, JPÅ).

Alkekung (*Plutus alle*). 1 dött ex. hittades på isen söder om Vinön på Storbjälmaran 6.1.1965. Fågeln hade då varit död någon tid. Beläggsexemplaret finns bevarat hos firma TORE HANSON, Örebro. Arten är ny för Närke.

Turturduva (*Streptopelia turtur*). 1 ex. iaktogs i Kvismaren 1.6. (ST). Första 1900-talsfyndet i Närke.

Hökuggla (*Surnia ulula*). Höstfynd av ensamma fåglar föreligger från Garp- hyttan 10.10. (TK), från Oset 31.10. (JPÅ) och från Tysslingen 5.11. (BL).

Sparvuggla (*Glaucidium passerinum*). Samstämmiga uppgifter från rapportö-

rerna visar att arten var ovanlig. Talrika observationer föreligger december.

Kungsfiskare (*Alcedo vintrosa*) (AM, BM, KR, M) i Täljeån, Arbogaån samt Sv.

Härfågel (*Upupa epops*) (SL m.fl.). 1 ex. som iaktogs i befolkningen funnits någon t.

Gråspett (*Picus canus*) och 1 ex. vid Ödeby i norra

Vitryggig hacksp. Kvismaren 31.3., 16.7. och 4 (HEK, LES).

Berglärka (*Eremophila kvismarensis*) 5 ex. 17.12. och 1 vid Vena 11.12.1966 (RN).

Sommargylling (*Columba palustris*) (Hjälmaran 10.6. (EN), vid 16.6. (AM, MR).

Körp (*Corvus corax*). D. har ökat högst påtagligt. E. av par eller ensamma fåglar med något par i Kilsbergen också i sydöstra delen av la-

Ringtrast (*Turdus iliacus*) årets enda observation (RO)

Svart rödstjärt (S. tiorer av 1 ex. vid Trystor (LJ, AM, MR).

Näktergal (*Luscinia luscinia*) hördes 6-7 sjungande hanar

Blåhake (*Luscinia svecica*) sträcket. Ses nu årligen on (BR), Velandasjön 10.5. (R) 2 ex. vid Oset 11.5. (KR).

Flodsångare (*Locustella fluviatilis*) Kvismaren 11.6. (HK). I 14.6.-20.6. (HK, BR, CR)

Kärrensångare (*Acercaea alpestris*) fynd har gjorts i Närke är hördes under tiden 2.6.-21 områden med brännässlor sångare hördes dessutom (MR) samt vid Markkärret

Höksångare (*Sylvia hortensis*)

terna visar att arten var ovanligt mycket i rörelse under senhösten och förvintern. Talrika observationer föreligger såväl från skogstrakterna som slättområdena i oktober-december.

**Kungsfiskare** (*Alcedo atthis*). Häckning konstaterades i Svartån i närheten av Vintrosa (AM, BM, KR, MR). Iakttagelser under häckningstid har dessutom gjorts i Täljeån, Arbogaån samt Svartån strax väster om Örebro liksom vid Oset.

**Härfågel** (*Upupa epops*). 1 ex. vid Stubbetorp i sydvästra Närke 16.9. (SB, SL m.fl.). 1 ex. som iaktogs vid Tjugesta, Glanshammar 16.11. hade enligt ortsbefolkningen funnits någon tid på platsen (HG).

**Gråspett** (*Picus canus*). 1 hona vid Slätten nordost om Örebro 22.8. (LB) och 1 ex. vid Ödeby i norra Närke 28.12. (LC).

**Vitryggig hackspett** (*Dendrocopos leucotos*). 1 honfärgad fågel sågs vid Kvismaren 31.3., 16.7. och 4.11. (RE, BR, ST m.fl.) och 1 hane vid Sjömosjön 12.3. (HEK, LES).

**Berglärka** (*Eremophila alpestris*). Vid Oset sågs 3 ex. 9.3. (HEP) och vid Kvismaren 5 ex. 17.12. och 1 ex. 29.12. (HJ, ST m.fl.). Dessutom 1 ex. på en stubbåker vid Vena 11.12.1966 (RN).

**Sommargylling** (*Oriolus oriolus*). Ensamma fåglar noterades på Björkön i Hjälmarén 10.6. (EN), vid Multen nära Mullhyttan 11.6. (RO) och vid Tysslingen 16.6. (AM, MR).

**Korv** (*Corvus corax*). Denna under 1950-talet och tidigare i Närke sällsynta fågel har ökat högst påtagligt. Ett 20-tal observationer har gjorts under året, därav flera av par eller ensamma fåglar under häckningstid. Troligen häckar nu korven årligen med något par i Kilsbergen och i skogstrakterna nordväst om Vättern samt möjligen också i sydöstra delen av landskapet.

**Ringtrast** (*Turdus torquatus*). 2 ex. vid Klunkhyttan i Kilsbergen 4.4. utgör årets enda observation (RO).

**Svart rödstjärt** (*Phoenicurus ochruros*). Från Västernärke föreligger observationer av 1 ex. vid Trystorp 4.6. (RO) och av 1 ex. vid Vintrosa kyrka 12.8.-13.8. (LJ, AM, MR).

**Näktergal** (*Luscinia luscinia*). Uppträder nu årligen i Närke. Under året hördes 6-7 sjungande hanar i maj-juni.

**Blåhake** (*Luscinia svecica*). Tidigare betraktad som en stor raritet på vårsträcket. Ses nu årligen om våren och 1967 iaktogs ensamma fåglar vid Oset 10.5. (BR), Velandasjön 10.5. (RG), Svarten 11.5. (JG) och Kvismaren 20.5. (BR). Dessutom 2 ex. vid Oset 11.5. (KR).

**Flodsångare** (*Locustella fluviatilis*). 1 ex. sjöng i ett stort videbuskage i Västra Kvismaren 11.6. (HK). I Markkärret strax utanför Örebro hördes 1 sjungande hane 14.6.-20.6. (HK, BR, CR, BT).

**Kärrsångare** (*Acrocephalus palustris*). Med tanke på att tidigare endast fem fynd har gjorts i Närke är artens uppträdande 1967 anmärkningsvärt. Vid Kvismaren hördes under tiden 2.6.-21.6. sannolikt 4 olika hanar, vilka mestadels uppehöll sig i områden med brännässlor och gles bladvass (HJ, HK, BR m.fl.). Ensamma kärrsångare hördes dessutom vid Odensbacken 5.6. (TL), vid Lindbacka 16.6. (LJ, AM, MR) samt vid Markkärret sydost om Örebro 18.6. (HK, BT).

**Höksångare** (*Sylvia nisoria*). 2 ungfåglar vilka infångades vid Kvismaren



Sjungande flodsångare (*Locustella fluviatilis*) vid Markkärret utanför Örebro 20.6.1967.  
(Singing *Locustella fluviatilis* near Örebro on 20th June 1960.) Foto: BO THYSELIUS.

19.8. (HJ) resp. 9.9.-10.9. (JS, ST, UT m.fl.) utgör fjärde och femte fynden av arten i Närke. Samtliga fåglar har varit årsungar, vilka ringmärkts under sträcket i augusti-september.

Mindre flugsnappare (*Ficedula parva*). 1 ex. vid Torpstång, Götunda sn 15.6.-27.6. (HEK, LES).

Gulärta (*Motacilla flava*). I samband med ringmärkning fångades 21.5. vid Kvismaren 1 hane med karaktärer tillhörande rasen *Motacilla flava feldg* (ST).

Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*). Sjungande hanar noterades vid Tysslingen 28.5. (RG, BT), Kvismaren 3.6. (BM, KR) och Österängen utanför Örebro 15.6. (LB). 1 honfärgad fågel ringmärktes i Kvismaren 6.7. (BR). Vid Gålsjön på Västmanlandsgränsen noterades i mitten av juni 1 utfärgad hane + 1 hona under omständigheter som tydde på häckning (HEK, LES).

Tallbit (*Pinicola enucleator*). Årets enda fynd är 1 ex. vid Öby kulle, Kvismaren 29.10. (JP, ÄP).

Bändelkorsnäbb (*Loxia leucoptera*). 2 ex. vid Öby kulle, Kvismaren 5.11. (JOH).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*). Förekom i december liksom efter nyår 1968 i osedvanligt stor omfattning över hela landskapet. I Kvismareområdet noterades de största mängderna och närmare 15 000 ex. torde ha uppehållit sig här i sista decemberveckan. Från Mullhyttemotrakten rapporterades rekordartat med bergfinks (RO) och från Letälvområdet i sydvästra Närke meddelades att ehär i trakten har aldrig tidigare bergfinkar övervintrat i så stort antal som vintern 67-68 (LA). Från

Laxå rapporterades större ex. vid Sjömosjön (KL, siffror är svåra att få fram sågs praktiskt taget över in till fågelborden och torde bl.a. vara den obå regniga sensommaren o togs också ovanligt my vid Sjömosjön och 100 e (RO) och 40 ex. i Kvi Lappsparrv (Ca maximisiffran 7 ex. vid fåglar. Arten är årsvi

LA=LENNART AHLI  
BJÖRKWI, LB=LARS  
CD=CHRISTER DERNI  
HARRY GUSTAFSSON  
HÅKAN JOHANNESON,  
KARLSSON, HK=HAN  
TORD LARSSON, LBF  
LUNDEGÅRD, LL=LAI  
BO MÖRNERUD, EN=  
HEP=HANS-ERIK P  
ÄP=ÅKE PETTERSSO  
ROSENBERG, BR=BO  
JAN SONDELL, LES  
STRÖMBERG, JOS=J  
THORSELL, RT=ROI  
AZ=ANDERS ZETTER

Summary: Bl  
in 1967. Breeding  
ostralegus in Lake V  
in the 1950's a rare  
porzana, and Gallin  
urogallus x Lyrurus  
April. Aythya fulig  
now even breeding  
seven Acrocephalus  
5 have been recorded  
of the subspecies f

Laxå rapporterades »stora flockare» (LBF) och i norra Närke sågs bl.a. en flock om 1 000 ex. vid Sjömosjön (KL, HEK, LES) och en om 550 vid Götavi (KL). Några totalsiffror är svåra att få fram, då spridningen över landskapet var mycket jämn och arten sågs praktiskt taget överallt. En rad rapporter finns om att bergfinkarna sökt sig in till fågelborden och där väckt visst uppseende. Orsaken till massuppträdandet torde bl.a. vara den obärgade säd som fanns kvar ute på fälten som en följd av den regniga sensommaren och hösten. I samband med bergfinkens kvarstannande iaktogs också ovanligt mycket bofink (*F. coelebs*) i slutet av december, bl.a. 30 ex. vid Sjömosjön och 100 ex. vid Götavi (KL), 10 ex. vid Vena (RN), 20 ex. i Mullhyttan (RO) och 40 ex. i Kvismaren (BT m.fl.).

Lappsparrv (*Calcarius lapponicus*). Sex observationer på vårsträcket med maximisiffran 7 ex. vid Oset 22.4. (RG, BT). På hösten tre iakttagelser av ensamma fåglar. Arten är årsviss såväl vår som höst.

LA=LENNART AHLÉN, UA=ULF ALLVIN, BA=BERTIL ANDERSSON, SB=SUNE BJÖRKWI, LB=LARS BROLUND, AB=ANDERS BROMS, LC=LENNART CARLSSON, CD=CHRISTER DERNFALK, RE=RUNE ERIKSSON, JG=JAN GUNNARSSON, HG=HARRY GUSTAFSSON, RG=ROGER GYLLIN, JOH=JAN-OLOF HERMANSSON, HJ=HÅKAN JOHANNESSEN, LJ=LAGE JONSSON, HEK=HANS-ERIK KARLSSON, TK=TÖRE KARLSSON, HK=HANS KÄLLANDER, KL=KENT LARSSON, SL=STIG LARSSON, TL=TORD LARSSON, LBF=Laxå Biologiska Förening, BL=BJÖRN LÖRIN, DL=DAVID LUNDEGÅRD, LL=LARS LUNDELL, PM=PAUL MALM, AM=ARNE MÖRNERUD, BM=BO MÖRNERUD, EN=EINAR NILSSON, RN=RAGNAR NILSSON, RO=RUNE OLSSON, HEP=HANS-ERIK PELLEGAARD, JP=JAN PETTERSSON, OP=OVE PETTERSSON, ÅP=ÅKE PETTERSSON, JPÅ=JAN PÅLSGÅRD, KR=KLAS ROSENBERG, MR=MATS ROSENBERG, BR=BO RUNESSON, CR=CAJ RUNESSON, CS=CLARK SINCLAIR, JS=JAN SONDELL, LES=LARS-ERIK SPRITT, NES=NILS-ERIK STRÖM, KS=KENT STRÖMBERG, JOS=JOHNNY SUNDSTRÖM, KRS=KRISTER SÖLVELING, ST=STEFAN THORSELL, RT=ROLAND THUVANDER, BT=BO THYSELIOUS, UT=URBAN TORESSON, AZ=ANDERS ZETTERMAN, ÖNF=Östernärkes Naturvårdsförening.

Närkes Ornitologiska Förening  
genom

ROGER GYLLIN KENT LARSSON

**Summary: Bird report from the province of Närke (appr. 59° N. lat.) in 1967.** Breeding records of *Larus marinus* in Lake Hjälmarén, of *Haematopus ostralegus* in Lake Vättern and of *Alcedo atthis* in the River Svartån. *Corvus corax*, in the 1950's a rare visitor, now probably breeds annually. *Botaurus stellaris*, *Porzana porzana*, and *Gallinula chloropus* were unusually numerous in spring. A hybrid *Tetrao urogallus* x *Lyrurus tetrix* was seen at close range at a lek of *Lyrurus tetrix* on 1st April. *Aythya fuligula* and *Bucephala clangula* have increased markedly, the latter now even breeding in shallow, reed-covered lakes in the agricultural district. Six or seven *Acrocephalus palustris* were heard in June, a remarkable fact as only a total of 5 have been recorded earlier in the province. A *Motacilla flava* showing the characters of the subspecies *feldegg* was caught on 21st May. Other records include 2 *Branta*