

Sjöorre (*Melanitta nigra*). En flock hördes natten till den 15.5.1948 sträcka över Pershyttan i sydvästra Västmanland. T. HERNER

Smådopping (*Podiceps ruficollis*). Ett ex. av denna art hittades enligt meddelande av konservator G. NILSSON, Västerås, död i en mjärde vid Geddeholm söder om Västerås den 29.4.1946. H. AVELIN, B. H. GIRELL

Skogsduva (*Columba oenas*). Den 28.3.1951 anträffades förutom en nyligen död fågel tvenne skogsduvor som uppehöllo sig vid en lada i byn Ström strax söder om Umeå. Fåglarna voro kvar ännu den 6.4. Ankomsten tidig med hänsyn till den sena våren. M. HÄGGLÖF

Rödbenan (*Tringa totanus*) har av oss iakttagits vid sundet mellan Björnön och Hesslö, söder om Västerås den 14.8.1936 (3 ex.), 21.8.1936 (1 ex.) och 6.7.1937 (2 ex.). H. AVELIN, B. H. GIRELL

Fjällpipare (*Charadrius morinellus*). En fågel med ungar sågs av E. NYLIN, Holsäker, sommaren 1935 på Städjan, och S. ENMALM, Björbo, har sett en kull på samma lokal den 8.7.1946. G. INGRITZ

På fjället Himmeråsen i Idre sn Dalarna fann jag den 13.6.1950 ett bo av fjällpipare med full kull. Enligt erhållna uppgifter har fågeln häckat på detta fjäll sedan minst 10 år tillbaka. R. THORÖ

Svarttärna (*Chlidonias niger*). Vid Börringesjön sågos den 5.6.1950 ej mindre än 28 svarttärnor. S. ULFSTRAND

Vid Indalsälven i Lit, Jämtland, observerades 6 ex. av denna art den 28.5.1948 och 1 ex. våren 1949. PER N. JONSSON

Skrattmås (*Larus ridibundus*). Numera årsvisss som häckfågel i Jämtland. Häckar sedan mera än 10 år vid Ändsjön på Frösön (1949 ca 60 par) och årligen även vid Indalsälven i Lit sedan 1945 och vid Annasjön i Åre sedan 1946. PER N. JONSSON

#### Summaries:

1. The Dotterel in Öland in November. Three specimens of *Charadrius morinellus* were observed in Öland on November 2, 1950. — An unusually late record. Normally the migration flight takes place during August and September.

2. Early Purple Sandpiper in the 'Skärgård' off Gothenburg. One specimen of *Calidris maritima* was observed on August 13, 1950, in the archipelago off Gothenburg. A few specimens pass the winter on the Swedish west coast. It is most often seen to migrate in October.

3. Observations of the Common Crane in Småland. A flock consisting of at least 200 *Grus grus* was seen near Lake Ryssby on April 7, 1950. The species breeds sparsely in the bogs in the vicinity. The crane has returned to several breeding places from which it was driven away during the war by the peat-industry.

4. Can the Great Tit kill other birds when defending its nest? In a nest of *Parus major* with 2 to 3 days old young a female *Muscicapa hypoleuca* was found lying dead with a large hole in the abdomen.

87297

87298

87299

5. Late Swallow on November 7, 1950, an *Apus apus* v.

6. The Black Gull, 1950, a *Dryocopus martius* from Hälsingborg, of 50 to 100 m.

7. Manx Shearwater observed off Külsjö, record of this species.

8. The Grey Heron bred on a lake in Sweden.

9. The Grey Heron was observed feeding on fish.

10. The Serin, *Serinus canaria*, was observed on November 5 and on the following day there was no evidence of the species in Sweden.

11. Remained only in one locality, includes 6 pairs and 2 specimens.

12. The Bean goose, *Anser fabalis* was observed in the southernmost part of Sweden.

13. Short note on regular breeding of *Acrocephalus paludicola* and *Chlidonias niger*.

LARS VON HANSEN und Rassenbildung

v. HAARTMANDE läsarna av denne  
8, 1949). Men författarens  
av författarens  
där undersökning  
också flugsnappar  
ha revir av tre typer  
benreviers. Även