

Lavskrika (*Perisoreus infaustus*). 1 ex. vid N. Risshyttesjön, Silvberg (Gustafs kommun), 25.8.1963 (KA).

Gärdsmyg (*Troglodytes troglodytes*). Arten tycks i olikhet med stjärtmesen haft svårt att övervintra 1962-1963. Endast 1 ex. rapporterat från S. Dräcke, Hedemora, 1963 (KB).

Ringtrast (*Turdus torquatus*). 1 ex. ♂ kvarteret Borgen, Säter, 21.4.1963 (KA).

Gräshoppsångare (*Locustella naevia*). 1 ex. sjungande St. Grundet, Hovran, Hedemora, 7.6.1963 (KB); 2 ex. samma lokal 20.6.1963 (JP). 3 ex. SörbogrunDET vid Hovran, Hedemora, 15.6.1963 (KR); 4 ex. samma lokal 20.6.1963 (JP). 1 ex. sjungande i Prästhyttan, Hedemora, 10.7.1963 (KB). 1 ex. vid kyrkan, Grytnäs, försommaren 1963 (AB).

Flodsångare (*Locustella fluviatilis*). 1 ex. Avesta 29.5.1963 (AB, GN).

Steglits (*Carduelis carduelis*). En sjungande ♂ Dräcke, Hedemora, 16.4.1963 (KB).

Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*). 1 ex. Norrdalen, Säter, 26.5.1963 (IM). En något utfärgad ♂ sjöng på samma lokal 2.6.1963 (IM, ED, NR); och en outfärgad ♂ 9.6.1963 (ED); flera varianter av sången hördes 21.6.1963 (ED). En röd ♂ sjöng vid Hälla gård nära sjön Hovran, Hedemora, 7.6.1963 (KB).

Ortolansparv (*Emberiza hortulana*). Tycks bli allt sällsyntare. 1 ex. Hälla gård, Hedemora, 16.5.1963 (BL, JO). Flera i Dalsbyn, Säter, i juni 1963 (IH).

Lappspärv (*Calcarius lapponicus*). 10 ex. V. delen av sjön Hovran, Hedemora, 1.5.1961 (HS).

JA = JOEL ANDERSSON, KA = KARL ANDERSSON, AB = ALLAN BEERMANN, KB = KJELL BYHLIN, EC = ERIC CARLSSON, ED = ELIS DAHLGREN, HF = HARRY FORSMARK, IH = INGRIID HEDMAN, EH = ERIC HOLMGREN, AK = ANNA KARLSSON, EK = ERIK KARLSSON, HK = HARRY KARLSSON, SK = SVEN KARLSSON, KK = KARL KLASSON, BL = BERNDT LINDBERG, IM = IVAR MATSBO, NM = NILS MODIN, GN = GÖTE NYHLÉN, JO = JAN ODELSTAD, JP = JOHN PALM, NR = NILS RYLANDER, BS = BERTIL SKOGLUND, HS = HÅKAN SUNDIN,

Södra Dalarnas Naturvänner
genom
ELIS DAHLGREN

Summary: Bird report from the province of Dalarna in 1963. Decreasing populations are reported of *Falco tinnunculus*, *Columba oenas*, *Strix aluco*, *Lullula arborea* and *Emberiza hortulana*. There are several reports of *Crex crex*, *Locustella naevia* and *Carpodacus erythrinus*, as well as some occasional records of *Streptopelia decaocto*, *Upupa epops* and *Locustella fluviatilis*.

5. Fågelrapport från Närke 1963

Som grund för denna liksom tidigare årsrapporter ligger ett utpropp, vilket utsänts till alla SOF-medlemmar i Närke. Utproppet innehåller bl.a. förfrågningar rörande en del fåglars uppträdande i landskapet och nedan refereras till detta.

87401

Vädret
Vid året
rades. I s
temperatu
Islossni
av maj. M
kom i jun
flera kraft
var ur fäg
kom i mit
meterdjup
i mitten a
låg kvar p
S må l c
hotad om
att med sä
i en göl on
häckning i
Grå h o
på Tisnare
fågeln släp
S må d
20.5.-14.9
Stors l
Den 27.10.
Vit st
Fågelsjön,
byås kyrka
Snatt.
(HJ) och v
vid Göksho
Stjärt
maren, mer
den 5.6. I
konstaterac
Alfåge
I Svartån r
m.fl). Unde
Hjälmarens,
Svårta
tycks nume
(IF, RG), e
Storsk
der i Storh
Salskr
vår och höe
som mest 3:
ligger; 2 ex

Vädret i Närke 1963:

Vid årets början låg medelmåttigt snötäcke över bygden och ned till -25°C noterades. I slutet av januari kom mildare vindar med 0-gradig luft. Vinterns lägsta temperatur, -31°C , mättes den 19.2. Mars månad blev osedvanligt kall och vintrig.

Islossningen kom i slutet av april och på mindre vatten låg is kvar ännu i början av maj. Maj blev dock genomgående solig och varm, medan flera regnperioder förekom i juni. För Örebro mättes $+30^{\circ}\text{C}$ den 6.7., och denna månad hade för övrigt flera kraftiga sommarstormar och regn. Större delen av tiden augusti–september var ur fågelsynpunkt god med sol, svaga vindar och få regnperioder. Första frosten kom i mitten av oktober. I slutet av november följde en kort vinterperiod med decimeterdjup snö och -17°C den 25 i månaden. Därefter blev det åter mildt och först i mitten av december is på t.ex. Hjälmaren. Kylan vek vid årsskiftet, då snö endast låg kvar på nordliga lägen och sunden gick öppna.

Smålom (*Gavia stellata*). Då artens existens som häckfågel i landskapet synes hotad ombads rapportörerna meddela eventuella häckningar. Härigenom framkom, att med säkerhet endast ett par fick ungar på vingarna. Paret häckade i Kilsbergen i en göl om 20×8 meter, vilket torde vara ett av de minsta vatten smålom genomfört häckning i (LA).

Gråhakedopping (*Podiceps griseigena*). Den 8.3. hittades 1 ex. oljeskadat på Tisnarens is (OL). Genom god vård av herr GUNNAR LARSSON, Finspång, kunde fågeln släppas fri i början av maj.

Smådopping (*Podiceps ruficollis*). 1 ex. observerades i Fågelsjön, Kvismaren 20.5.–14.9. (HC, CR, BT m.fl.).

Storskarv (*Phalacrocorax carbo*). 1 dött ex. hittades i Storhjälmaren 6.10. Den 27.10. sågs 2 ex. vid Oset (LB) och 10.11. 2 ex. i Storhjälmaren (HC).

Vit stork (*Ciconia ciconia*). Den 29.6. iaktogs 1 ex. komma flygande lågt över Fågelsjön, Kvismaren. Fågeln tog höjd i termiken och försvann mot NNE över Norrbyås kyrka (JS m.fl.).

Snatterand (*Anas strepera*). Vid södra Essundet i Hjälmaren sågs 1 ♀ 22.4. (HJ) och vid Oset 1 ex. 21.7. (KB, DL, LS). Dessutom noterades en flock om 5 ex. vid Göksholm, Storhjälmaren 6.10. (TG).

Stjärtand (*Anas acuta*). Redan 1962 misstänktes häckning i Fågelsjön, Kvismaren, men blev aldrig fullt klarlagd. 1963 kunde dock häckning säkert fastslås, då den 5.6. 1 ♀ med 2 små ungar sågs (Kv. fstn). Detta är första gången häckning är konstaterad i Kvismaren.

Alfågel (*Clangula hyemalis*). 4 ex. sågs vid södra Essundet den 17.4. (HC, NÄN). I Svartån mitt inne i Örebro stads centrum låg 3.–6.10. en honfärgad fågel (BT, TÖ m.fl.). Under tiden 20.10.–17.11. föreligger inte mindre än sju observationer från Hjälmaren, varav en flock om 30 ex. vid Essön 10.11.

Svårta (*Melanitta fusca*). Denna tidigare mycket sällan observerade fågel tycks numera vara årsviss i landskapet. Under 1963 sågs i Storhjälmaren 5 ex. 31.8. (IF, RG), ensamma fåglar 1. och 15.11. (TL, BR, JS) samt 4 ex. 1.12. (RE-n, GN).

Storskrake (*Mergus merganser*). Liksom tidigare höstar samlades stora mängder i Storhjälmaren. Maximum sågs 1.11. med ca 4.000 ex. (TÖ).

Salskrake (*Mergus albellus*). Ses regelbundet men sparsamt på flera lokaler vår och höst. I Segersjövik, Storhjälmaren, sågs rastande fåglar 29.9.–1.12. med som mest 32 ex. 20.10. (IF) och 25 ex. 26.10. (RE-n, GN). En vinterobservation föreligger; 2 ex. i en vak på Bofors skjutfält i Kilsbergen 22.2. (NÄN).

Gravand (*Tadorna tadorna*). Den 26.4. sågs 1 ex. vid Oset (ST).

Rostand (*Casarca ferruginea*). 1 ex. i Fågelsjön, Kvismaren, 25.—28.5. (BT m.fl.).

Grågås (*Anser anser*). Över Tysslingen sträckte 7 ex. mot N 28.4. (BT). Grågåsen hålls som frittflygande parkfågel i Örebro, varför det kan ha rört sig om sådana, men då grågässen sträckte tillsammans med 160 sädgäss (*Anser fabalis*) förefaller det sannolikt, att det var frågan om vilda fåglar.

Mindre sångsvan (*Cygnus columbianus*). 1 ex. observerades i Kvismaren 12.—13.4. (HC, RS, ST).

Ormvråk (*Buteo buteo*). Gjorde vintern 1963—64 övervintringsförsök på flera håll i landskapet. Vid Kvismaren kvarstannade 2—3 ex. till efter nyår 1964 och vid Oset 1 ex. till mitten av januari 1964 (Kv. fstn). I Glanshammar sågs 1 ex. 30.12. (HG).

Glada (*Milvus milvus*). 1 ex. iaktogs vid Oppboga i norra Närke 25.3. (HN).

Havsörn (*Haliaeetus albicilla*). Liksom brukar vara fallet uppehöll sig några havsörnar, detta år 2 juv., på Storchjälmaren under senhösten (HJ, CR). På våren, 13.—24.4., noterades 1 juv. Fågeln ambulerade mellan Kvismaren, Tysslingen och Oset och var lätt att känna igen på sin trasiga stjärt (BT, ST). Den 2.7. hittades 1 ung havsörn död i norra Närke vid Järle. Fågeln var ringmärkt i Holstein 11.3.1963 och befanns vid undersökning på Statens veterinärmedicinska anstalt kvicksilverförgiftad. Ytterligare ett sommarfynd har gjorts; 18.8. passerade en ungfågel över Kvismaren mot SW (HN-n).

Blå kärrhöök (*Circus cyaneus*). 1963 ägde för första gången ingen häckning rum i Kvismaren, utan endast en ensam ♀ sågs under sommaren. En närmare redogörelse för kärrhöökarnas minskning under de senaste åren finns i skriften »Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1963». 1 ♂ övervintrade i Kvismaren 1962—63 och i slutet av februari sågs även 1 ♀ (CR, JS m.fl.). På hösten 1963 dröjde sig en ♂ kvar länge och observerades senast 22.12. (RS). Övervintrande blå kärrhökar är mycket ovanliga i Närke.

Ängshök (*Circus pygargus*). Vid Svalnäs, norra Tysslingen, sågs 22.5. först en ♀ och strax därpå även en ♂. När båda fåglarna kommit till platsen tog de höjd och seglade ned mot sjöns södra del. Vid senare besök kunde de tyvärr inte återfinnas (BT). Över Stora Mellösa i östra Närke iaktogs 19.7. 1 ♂ (RE) och 21.8. jagade en ♂ över ängarna i Kvismaren (BT).

Stenfalk (*Falco columbarius*). Så gott som alla vintrar brukar något ex. ses. 1962—63 övervintrade 1 ex. i Kvismaren (Kv. fstn).

Tornfalk (*Falco tinnunculus*). Veterligt häckade i Närke endast 2 par 1963. Arten övervintrade såväl vid Kvismaren som Oset 1962—63. Osetfågeln sågs emellanåt jaga inom höghusbebyggelsen i norra delarna av Örebro.

Tofsvipa (*Vanellus vanellus*). År 1962 sågs 1 ex. vid Oset 25.1. Efter att ha rastat en stund på sopstationen lyfte fågeln och flög västerut. Snötäcket var en knapp decimeter, och ett par minusgrader rådde (KL, CR). På samma lokal observerades 1 ex. den 1.1. samma år (JÅ). Tidigare föreligger endast ett januarifynd från Närke. Den 18.1.1930 sågs 1 ex. dra över Oset (ER).

Kust/ljungpipare (*Charadrius squatarola/appricarius*). En flock om 175 ex. sågs den 3.6. flyga fram och åter över Rynningeviken, Oset, innan fåglarna småningom tog kurs och försvann i NE (CR, BT). Dylika vårobservationer är sällsynta i landskapet.

Fjäll
hittades 1
levande fj
fjällpipare
vid Lanna

Roske
Anmärkn
då helt re
Närke (R

Röds
utan blott
ytterligare
Ytterligare

Myrs
sträckte ö
som noter

Smal
24.5. (KJ,

Fjäll
sjön Storb
spröten (A
ner av un

Havs
och under
häckfynde

Skrat
hyste en a
403 bon (I

Tretå
på Hemfj
Närke.

Svart
Hjälmarer

Ring
sågs sista
platser me

Turk
takt. Und
Hallsberg,
Bolby och

Torn
vid Lällky
terad. De

Spar
porter inl
Kvismare
fram till

Fjällpipare (*Charadrius morinellus*). Vid tiden för vårsådden omkring 13.5., hittades 1 dött ex. vid Högby, Stora Mellösa. Vid den döda fågeln uppehöll sig en levande fjällpipare, som först på mycket nära håll tog till flykten. Den upphittade fjällpiparen är nu monterad (rapport till RE). Den 8.10. rastade en flock om 20 ex. vid Lanna i Västernärke (HV).

Roskarl (*Arenaria interpres*). Arten observerades under året vid åtta tillfällen. Anmärkningsvärd är en observation vid Oset 20.7. då sydvästlig storm rådde. På den då helt renblåsta fågeluddan rastade en flock om 16 ex., det största antal som setts i Närke (RG). Vid samtliga övriga observationstillfällen iaktogs 1–2 ex.

Rödspov (*Limosa limosa*). Ingen häckning ägde under året rum i Kvismaren utan blott 1 ♂ sågs, vilken spelade över området hela våren. Den 5.5. sågs tillfälligt ytterligare en rödspov, och troligen samma fågel sågs senare samma dag vid Oset. Ytterligare två observationer föreligger från Oset, 11.–12.5. och 19.7. (LB, ST m.fl.).

Myrsnäppa (*Limicola falcinellus*). 1 ex., som under karaktäristiskt lockande sträckte över Oset på morgonen 1.9., utgör enda observationen för året. Den invasion, som noterades vid kuststationerna, gick Närke spårlöst förbi (RG, BT).

Smalnäbbad simsnäppa (*Phalaropus lobatus*). Vid Oset noterades 1 ex. 24.5. (KJ, CR) och 1 ex. 12.8. (LB).

Fjälllabb (*Stercorarius longicaudus*). På morgonen den 23.5. flög 1 ex. över sjön Storbjörken i västra Närke i nordlig riktning tydligt exponerande de långa stjärtspöten (AL). Detta är den första säkra observationen av arten i Närke. Observationer av unga, obestämbara labbar, såsom 22.7. vid Oset, görs numera nästan årligen.

Havstrut (*Larus marinus*). Arten visar sig regelbundet i vakarna på våren och under hösten och ses då och då även sommar- och vintertid. 1963 gjordes första häckfyndet, då 1 par med lyckat resultat häckade i sjön Toften (MM).

Skrattmåså (*Larus ridibundus*). Vid Oset som under mitten av 1950-talet hyste en av landets största kolonier med ca 3.000 häckande par, fanns detta år endast 403 bon (BT).

Tretåig måså (*Rissa tridactyla*). I början av mars hittades 1 ad. död på isen på Hemfjärden, Hjälmaren. Fågeln finns nu monterad. Detta var fjärde fyndet i Närke.

Svarttärna (*Chlidonias nigra*). I en koloni fisktärnor på Grundholmarna i Hjälmaren upptäcktes 1 svarttärna 5.6. (GN).

Ringduva (*Columba palumbus*). 3 ex. gjorde övervintringsförsök 1962–63 och sågs sista gången 15.1. De senaste åren har försök till övervintring gjorts på flera platser men varje gång misslyckats.

Turkduva (*Streptopelia decaocto*). Expansionen av denna art fortsätter i snabb takt. Under häckningstid har 1962 och 1963 observationer gjorts i Örebro, Kumla, Hallsberg, Vretstorp och Odensbacken och tillfälligt uppträdande fåglar har setts i Bolby och Labbåsen i Västernärke, i Glanshammar och vid Oset.

Tornuggla (*Tyto alba*). 15.12.1962–9.1.1963 uppehöll sig 1 ex. på en gård vid Lillkyrka. Sistnämnda dag hittades tornugglan ihjälsvulten och den är nu monterad. Detta är tredje fyndet i Närke.

Sparvuggla (*Glaucidium passerinum*). I mitten av september började rapporter inkomma om iaktagna sparvugglor på icke-häcklokaler, såsom t.ex. Oset, Kvismaren och flera platser längs södra Hjälmarsstranden. Observationerna fortsatte fram till nyår. Flera intressanta iakttagelser har gjorts i samband med invasionen.

I Mullhyttan sågs 3 ex. inne i samhället och 2 av dem flög ihjäl sig mot en fönster-ruta under försök att fånga kanariefåglar (RO). I Örebro sågs i slutet av november 1 ex. sittande på en balkong på ett hyreshus utan att låta sig störas av trafik eller närgångna människor. 1 ex. flög på en ruta mitt inne i centrum och omkom. Allmänt rapporteras att sparvugglorna varit mycket oskygga.

Gråspett (*Picus canus*). Några av de fåglar som visade sig på hösten 1962 (VF 24:70) blev stationära en längre tid. En fågel som första gången sågs i Mullhyttan 26.12.1962 stannade till 7.4.1963 och gråspetten vid Römossen, Svartå, observerades mars ut (MM, RO). På Essön i Hjälmarens iaktogs 1 ♂ 19.2. (RE).

Vitryggig hackspett (*Dendrocopos leucotos*). Ett par uppehöll sig hela året på en lokal i Kilsbergen, och parning iaktogs 12.5. (BU m.fl.). Dessutom sågs 1 ex. vid Sixtorp 17.2. (RO) och 1 ex. vid Frösvidal 1.5. (HN).

Berglärka (*Eremophila alpestris*). Vid Oset sågs 1 ex. hela vintern 1962-63 (KS m.fl.). I Kvismaren sågs under januari-mars 1-6 ex. och den 16.2. en flock om 12 ex. (JG, JP, SP, CR, ST). Vid Askersund observerades 1 ex. 15.1. (OL).

Svart rödstjärt (*Phoenicurus ochruros*). Den 21.6. upptäcktes 1 sjungande ♂ i centrum av Örebro. Fågeln hördes en vecka framöver (BS m.fl.).

Näktergal (*Luscinia luscinia*). Trots rapporterad ökning på andra håll i landet är näktergalen fortfarande sällsynt i Närke. 1 ex. sjöng från den 11.5. och drygt en månad framåt vid Göksholm (KB, HC, GN, ST) och vid Lännäs hördes 1 ex. den 10.6. vilket enligt uppgift skulle ha funnits på platsen någon tid (AZ).

Gräshoppsångare (*Locustella naevia*). Redan 1962 konstaterades en kraftig ökning av antalet sjungande ♂♂ i Kvismaren och minst 20 ex. inräknades. 1963 hördes på samma lokal inte mindre än ca 50 sjungande ♂♂, varav 38 ringmärktes av Kvismare fågelstation. 1-2 ex. hördes sjunga på ytterligare tolv lokaler.

Kärrsångare (*Acrocephalus palustris*). I Kvismaren hördes 1 sjungande ex. den 7.6. (CR). Detta torde vara femte fyndet i Närke.

Rödstrupig piplärka (*Anthus cervinus*). På höststräcket är arten inte ovanlig och kan vissa dagar i början på september vara den dominerande småfågeln på ängarna vid Oset. Numera tycks den också vara årsvis på våren (före 1957 endast två vårfynd) och iaktogs 1963 15., 18. och 26.5. med 1 ex. vid varje tillfälle (TL, BR, CR, BT). Inget vårfynd finns ännu utanför Oset.

Snösiska (*Carduelis hornemanni*). Ses vissa vintrar såsom t.ex. 1962-63 inte så fåtaligt. Åtminstone ett 10-tal observerades vid Kvismaren och enstaka vid Oset.

Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*). Den 26.-28.5. sjöng en utfärgad ♂ i Lövhölmén, Kvismaren, och den 9.6. upptäcktes en likaledes utfärgad ♂ vid Norrbyås halvannan kilometer därifrån. Den 15.6. fanns en utfärgad ♂ sjungande på samma plats som året innan strax nordost Öby kulle i Kvismaren (HC, CR, ST m.fl.). Vid Tybble utanför Örebro hördes 1 ♂ den 1.6. (HC).

Tallbit (*Pinicola enucleator*). Praktiskt taget alla vintrar görs åtminstone något fynd. 1.-6.1. sågs 2-5 ex. i Kvismaren (AZ, LOS, US) och 8.2. 2 ex. i Kilsbergen (TÖ). På hösten noterades 2 ex. i Kvismaren 7.10. (HN-n) och omkring 20.10. 1 ex. utanför Örebro (rapport till BT).

Snösparv (*Plectrophenax nivalis*). Arten övervintrar normalt i Kvismaren i ett antal om högst några hundra. Vintern 1962-63 var snösparven ovanligt talrik och flera observationer av flockar på ca 500 ex. gjordes. Den 28.1. sågs emellertid en jättestor flock om 1.600 ex. (CR, BT, ST).

L
mare

De
i nu
stella
teras
och
av d
serve
ornit
Gård
mars
fällig
rödb

LA
CARL
STRÖ
SON,
Kv.f.
TL =
MAU
NILS
PETT
SON,
LARS
SON,
BJÖB
ÅQVI

St
reco
mari
SVA
ing
tinnu
in 19
Janu
Janu
May
troph

Lappsparrv (*Calcarius lapponicus*). Den 1.-12.1. uppehöll sig 1 ex. i Kvismaren (HC, RE-n).

Vintern 1962-63 och dess verkningar.

Den i hela Europa ovanligt kalla och långvariga vintern satte uppenbart sina spår i numerären hos många arter. Mot normalt 6-8 ropande rördrommar (*Botaurus stellaris*) hördes våren 1963 en enda. Om enkelbeckasinen (*Gallinago gallinago*) rapporteras från ett halvduzin lokaler en klar minskning. Också vattenrall (*Rallus aquaticus*) och sothöna (*Fulica atra*) led hårt av vintern, och vid Oset häckade inget enda par av den senare. Ingen kungsfiskare (*Alcedo atthis*) häckade, och endast två höstobservationer föreligger. Hos talgoxe (*Parus major*) och blåmes (*P. caeruleus*) har många ornitologer genom holkkontroller kunnat notera en märkbar nedgång i beståndet. Gårdsmygen (*Troglodytes troglodytes*) minskade likaså, och vid ett område kring Hjälmarsnäs där de närmast föregående åren 4 par häckat hördes våren 1963 endast tillfälligt en sjungande hane. Från Kilsbergen rapporteras absolut bottenrekord för rödhake (*Erithacus rubecula*).

LA = LENNART AHLÉN, KB = KNUT BORG, LB = LARS BROLUND, HC = HÅKAN CARLESTAM, RE = RAGNAR EDBERG, RE-n = RUNE ERIKSSON, IF = INGEMAR FAHLSTRÖM, JG = JAN GUNNARSSON, HG = HARRY GUSTAVSSON, TG = TORSTEN GUSTAFSSON, RG = ROGER GYLLIN, HJ = HÅKAN JOHANNESSEN, KJ = KJELL JOHANSSON, Kv.fstn = Kvismare fågelstation, AL = ARNOLD LARSSON, KL = KENT LARSSON, TL = TORD LARSSON, OL = OLLE LILJEDAHL, DL = DAVID LUNDEGÅRD, MM = MAURITZ MAGNUSSON, GN = GUNNAR NILSSON, HN-n = HENRY NILSSON, NÅN = NILS-ÅKE NILSSON, HN = HERBERT NÅTHAMMAR, RO = RUNE OLSSON, JP = JAN PETTERSSON, SP = SVEN PETTERSSON, ER = ERIK ROSENBERG, BR = BO RUNESSON, CR = CAJ RUNESSON, LS = LENNART SAMZELIUS, JS = JAN SONDELL, LOS = LARS-OLOV STORM, RS = ROLAND STRÖM, KS = KENT STRÖMBERG, BS = BO SVENSSON, US = ULF SÖRLING, ST = STEFAN THORSELL, BT = BO THYSELIUS, BU = BJÖRN UHR, HV = HOLGER VIBERG, AZ = ANDERS ZETTERMAN, JÅ = JÖRAN ÅQVIST, TÖ = THOMAS ÖBERG.

Närkes Ornitologiska Förening
genom
ROGER GYLLIN

Summary: Bird report from the province of Närke in 1963. Breeding records of *Gavia stellata*, *Anas acuta* and, for the first time in this province, of *Larus marinus*. One specimen of *Haliaeetus albicilla* was found dead. It was investigated at SVA and found to have a high mercury content. For the first time there was no breeding of *Circus cyaneus* at Lake Kvismaren in 1963. Only two breeding pairs of *Falco tinnunculus* reported from the province. Several observations of *Streptopelia decaocto* in 1962 and 1963. Many records of *Glaucidium passerinum* from September 1963 to January 1964. Among others, records of *Melanitta fusca* yearly, *Vanellus vanellus* in January, sixteen *Arenaria interpres* on July 20th, one *Stercorarius longicaudus* on May 23rd, one *Tyto alba* on December 15th 1962-January 9th 1963 and 1600 *Plectrophenax nivalis* on January 28th.