

Sällsynta fåglar i Sverige 1988 — rapport från SOF:s raritetskommitté

ERIK HIRSCHFELD

Denna den fjortonde raritetskommittérapporten i *Vår Fågelvärld* behandlar de flesta fynd av sällsyntare fåglar i landet under 1988 och några från tidigare år. Ett fåtal arter som bara skall Rk-rapporteras i vissa delar av landet, t.ex. fjällabb och dvärgsparv, publiceras för överskådlighetens skull i den allmänna fågelrapporten (Tyrberg 1989).

I några fall kanske observationer saknas bland de godkända fynden. Det kan bero på att de underkänts (och följaktligen finns publicerade bland underkända fynd i slutet av denna rapport), att de inte rapporterats till Raritetskommittén (Rk) eller att de fortfarande är under behandling i väntan på kompletterande detaljer eller fotografier. Om någon läsare har upplysningar om sådana observationer tas de tacksamt emot av kommitténs sekreterare.

Under året har Rk behandlat drygt 500 rapporter, vilket är en liten ökning sedan föregående år. Cirka 20% av dessa har underkänts, vilket även det är en svag ökning. Elva rapporter har bordlagts i väntan på ytterligare informationer, dvs. ett minskande antal, som kanske tyder på att ornitologerna lärt sig att skriva utförligare rapporter.

Fågelåret 1988

Ett rekordstort antal nya arter för landet påträffades under 1988; nämligen sex stycken. Det började i april med en eremitskogstrast *Catharus guttatus* och en vandringsstrast *Turdus migratorius*. I juni fångades en svartstrupig järnsparv *Prunella atrogularis*, och i augusti upptäcktes en tundrasnäppa *Calidris mauri*. Under oktober ringmärktes två nya arter. Dels en sibirisk piplärka *Anthus hodgsoni*, en sedan länge väntad art, dels en mera oväntad, brokig kardinal *Pheucticus ludovicianus*. En mongolpipare *Charadrius mongolus* från juni

är fortfarande under utredning, och om någon läsare har fotografier av fågeln ifråga tas dessa tacksamt emot av Rk. En rödstjärt tillhörande rasen *Ph. ph. samamiscus* var första fyndet av denna ras.

En del andrafynd gjordes också: en provence-sångare *Sylvia undata* i maj, taigasångare av rasen *humei* i september och stentrast *Monticola saxatilis* i oktober. Ett fynd av isabellatörnskata *Lanius isabellinus* från 1984 har också godkänts för publicering.

Annars får 1988 sägas ha varit ett gott raritetsår. Speciellt minnesvärt var kanske höstens många rovfågelrariteter med ett rekordstort antal mindre skrikörnar, och sällsyntheter som eleonorafalk, dvärgörn, stäppörn och kejsarörn. En massinvasion av fjällabbar i södra Sverige i september-oktober satte också sin prägel på hösten. Oktoberrariteterna inkluderade stubbstjärtseglare, sibirisk järnsparv, nunnestenskvättor, kalandlerlärka, isabellatörnskator och tallsparv. Rekordstora antal större piplärkor visade sig från början av september, med en ovanligt hög andel inlandsfynd.

Bland äldre rapporter har godkänts en ny art, amerikansk skogssnäppa *Tringa solitaria*, och tre nya raser: en rödspov av den isländska rasen *islandica*, en vitvingad trut av den nordamerikanska rasen *kumlieni* samt en svart rödstjärt av någon av de sydostliga raserna.

Ändringar i rapportlistan

Från och med 1990 behöver inte följande arter rapporteras till Rk: grålira, mindre lira, storlabb och fjällabb från Dalarna—Medelpad och norrut. Flamingo av den europeiska rasen *roseus* läggs till listan, medan flamingos av andra raser inte skall Rk-rapporteras.

Godkända fynd 1988

Accepted records 1988

Islom *Gavia immer* (ca 147 — 4)

Sm: 1 ad. Revsudden 4.1 (Christer Lundin).

Gtl: 1 ad. Hoburgen 15.10 (Björn Andersson m.fl.).

Upl: 1 ad. Skatudden 29.4 (Patrik Brehmer).

Vb: 1 ad. Stora Fjäderägg 16.5 (Christer Olsson).

(Island, Nordamerika). Vål under normal årssiffra, som brukar ligga kring tio. Omkring tre fjärdedelar av fynden brukar göras längs Västkusten, därför är det anmärkningsvärt att samtliga fynd 1988 gjordes i Östersjön.

1987. *Sk*: 1 ad. Brantevik 27.10 (Magnus Ullman, Anders Jönsson).

Gulnäbbad lira *Calonectris diomedea* (15 — 2)

Sk: 1 ex. Hovs hallar 25.9 (Thomas Nilsson, Lars Olsson).

Hl: 1 ex. Glommen 16.8 (Margareta och Göran Lindh).

(Medelhavet och Atlanten). Sedan 1984 har arten varit årlig på Västkusten. Rimligtvis hänger det samman med en ökad förekomst i norra Atlanten. Även i Danmark ökar fynden, och gulnäbbad lira har varit årlig sedan 1986.

1986. *Hl*: 1 ex. Glommen 7.9 (Stefan Lagerblad, Anders Hultfeldt m.fl.).

Större lira *Puffinus gravis* (9 — 1)

Sk: 1 ex. Kullen 25.9 (Bo Petersson, Mats Rellmar m.fl.).

(Atlanten). Arten har anträffats under perioden juli till januari med en övervikt för september månad (4 ex.).

Stormsvala *Hydrobates pelagicus* (57 — 1)

Boh: 1 ex. ringmärkt Hermanö huvud 29—30.8 (Kåre Ström, Roland Börjesson).

(Norra Atlanten). Fågeln fångades på natten, under häckningstid. Framtida undersökningar får ge besked om huruvida det kan finnas en liten häckande population av arten i norra Bohuslän.

1975. *Sk*: 1 ex. funnen död i Limhamn 8.12 (genom Nils Kjellén). Fågeln finns på Zoologiska museet i Lund.

Silkeshäger *Egretta garzetta* (20 — 5)

Sk: 1 ex. Slusan, Falsterbo, 2—3.6 (Nils Kjellén m.fl.).

Bl: 1 ex. Utlången 7.5 (Niklas Holmström m.fl.), 1 ex. Torhamns udde 31.5 (Christer Herremo, Carl-Ivan Carlsson m.fl.).

Sm: 1 ex. Svartö, s. Kalmarsund, 30.5 (Gustaf Aulén,

Lars Lindell).

Gtl: 1 ex. Djupåns mynning, Hammars, 1.6 (Gunnar Westling, Inger Landgren).

Hl: 1 ex. Getterön, Båtafjorden och Klosterfjorden, 17.6—17.8 (Mikael Nord m.fl.).

(Södra Europa). Fågeln vid Svartö har här ansetts som identisk med Torhamnsindividen. Tidigare årshögsta var tre ex. 1971. Arten är inte årsviss ännu, men har anträffats under fem år på 1980-talet. Getteröindividen är den som stannat överlägset längst i landet (näst längst stannade ett exemplar vid Ottenby [14 dagar] under oktober och november 1968). Inflödet under våren märktes även i Danmark, där rekordantalet 7 ex. påträffades 7.5—23.7. I Finland noterades 3 ex. under 1988.

Ägretthäger *Egretta alba*

1985. *Nrk*: 2 ex. Kvismaren 31.5 (Staffan Bensch). (Sydöstra Europa och Asien). Den ena av dessa två kan vara identisk med en ägretthäger som sågs i Kvismaren 14.5 samma år, varför totalantalet blir fyra detta år. Fynd fr.o.m. 1988 behöver inte rapporteras till Rk och återfinns i den allmänna fågelrapporten (Tyrberg 1989).

Purpurhäger *Ardea purpurea* (21 — 0)

1981. *Vstm*: 1 2K Cementatippen, Köping, 22—26.9 (Göran Pettersson m.fl.). 1987. *Hl*: 1 ex. Nidingen 30.4 (Mikael Hake). (Kontinentala Europa). De flesta purpurhägrarna ses under våren, men tidigare finns bara två aprilfynd (18.4 1853 och 24.4 1967). Fynden är de första för respektive landskap.

Skedstork *Platalea leucorodia* (32 — 2)

Sk: 1 ad. Foteviken 2.6 (Peter Olsson, Kersin Norrman).

Hl: 1 ad. Getterön 22—24.6 (Carl-Ivar Hagman m.fl.).

(Kontinentala Europa och Asien). Tidpunkten och lokalerna typiska för arten.

Bläsgås *Anser albifrons*

Fåglar uppvisande karaktärer för den grönländska rasen *flavirostris* (9 — 11):

Sk: 6 ad. Tosteberga 13.2 (Patrik Österblad).

Vg: 1 ad. Östen 4.4 (Timo Niiranen, Anneli Sjölin), 1 ad. Östen 10.4 (Björn Spetz m.fl.), 2 ad. Boterstena 28.10 (Torbjörn Gustafson), 1 ad. väster Moholm 4.11 (Timo Niiranen, Eino Niiranen).

(Grönland). Flocken vid Tosteberga bidrar till ett remarkabelt högt antal under ett år. Samtliga iakttagelser har gjorts under normal gästid. Kanske spekulationerna om att bryta ut rasen till egen art kan öka antalet fynd i framtiden?

1986. *Vg*: 1 ad. Östen 18.10 (Torbjörn Gustafson).

Ameril

Sk: 1

(Nord: våren.

Kricka

Fåglar — 1):

Upl: 1 (rell).

(Nord: mellan Exemp krickor ligger i

1987. i

Blåvinj

1987. (Nord: ket är i tillsam skedde

Ringan

Bl: 1 berg

(Nord: som ni kinge c

Vitögd

1981. / hanar s

Vitnac

Hls: 1

(Nord: samma ha sette inte ko hands : i tolv å

1987. i m.fl.).

eller År. Det

Amerikansk bläsand *Anas americana* (11 — 1)

Sk: 1 ♂ Rönne 21.4—1.5 (Anders Lindén m.fl.).
(Nordamerika). Samtliga fynd utom ett är gjorda under våren. Samtliga sex fynd i Finland är från april—maj.

Kricka *Anas crecca*

Fåglar uppvisande karaktärer för rasen *carolinensis* (26 — 1):

Upl: 1 ♂ Angarn 23.4 (Johan Holmberg, Magnus Correll).

(Nordamerika). Sedan 1976 har rasen varit årlig med mellan ett och fyra ex., undantaget 1986, då ingen sågs. Exemplaren upptäckts ofta i sällskap med europeiska krickor i vassjöar i södra och mellersta Sverige. Fynden ligger mellan 9 april och 13 juni.

1987. *Vstm:* 1 ♂ Gussjön 24.4 (Patrik Cronlund).

Blåvingad ärta *Anas discors* (10 — 0)

1987. *Gstr:* 1 par Mårdängsjön 5.4 (Kjell Wallin m.fl.). (Nordamerika). Summan för 1987 blir därmed 5 ex. vilket är halva totalsumman. Fyndet är det första av ett par tillsammans; jfr Danmark där en häckning av arten skedde 1988 (Olsen i brev).

Ringand *Aythya collaris* (12 — 1)

Bl: 1 ♂ Fåholmen, sydost Norge, 3.4 (Andreas Wällberg).

(Nordamerika). Fågeln är säkert identisk med den hane som nu tillbringat sex vintersäsonger i sydvästra Blekinge och sågs vid Valje 27.11—2.12 1987.

Vitögddykand *Aythya nyroca* (27 — 0)

1981. *Nrk:* 1 ♂ Oset 3.4 (Sören Uppsäll). Ytterligare två hanar sågs i Mellansverige detta år.

Vitnackad svärta *Melanitta perspicillata* (23 — 1)

Hls: 1 ♂ Storjungfrun 18.6 (Lars Olausson m.fl.).

(Nordamerika). Arten är tidigare rapporterad från samma lokal 1977 och 1984. Enligt rykten skall den även ha setts där åren dessemellan, men några rapporter har inte kommit tillhanda. I så fall ligger det nära till hands att anta att det är samma fågel som hållit till där i tolv år.

1987. *Vb:* 1 2K ♂ Norrfjärden 12.6 (Johan Wallander m.fl.). Denna fågel är inte identisk med Västerbotten- eller Ångermanlandsindividerna från maj—juni samma år. Det är första observationen i landet av en 2K-fågel.

Ormörn *Circaetus gallicus* (33 — 3)

Sk: 2 ex. Falsterbo 7—8.9 (Bertil Svensson m.fl.).

Öl: 1 ex. Ottenby 31.8—6.9 (Bertil Gunnarsson, Ingvar Skoog m.fl.).

Vg: 1 ex. Bjällum, Hornborgasjön, 20.8 (Per Olof Swanberg).

(Kontinentala Europa). Fynden stämmer tidsmässigt bra, det är emellertid sällan som ormörnar stannar en längre tid. Den ena av Falsterbofågeln som kom sent på eftermiddagen 7.9 är förmodligen identisk med Ölandsfågeln. Upplysningar om ett eventuellt ytterligare exemplar på Öland tas gärna emot av Irk och Rk.

Stäpphök *Circus macrourus* (130 — 13)

Sk: 1 1K punkt 106, Havgård, 3.9 (Mikael Nord, Ulrika Ganning), 1 1K Havgårdssjön 18.9 (Bertil Svensson m.fl.), 1 ♂ Torna-Hällestad 20.9 (Martti Alatalo).

Öl: 1 2K ♀ Lilla Smedby 25.5 (Bo Petersson, Patrik Engström m.fl.), 1 ♂ Ås, Ottenby, 26—27.5 (Andreas Ståhl m.fl.), 1 2K ♂ Stenåsa 30.5 (Staffan Rodebrand).

Sm: 1 ♂ Markestadviken, Eksjö, 15—16.6 (Roland Ljunggren).

Gil: 1 3K ♂ Sundre 24.4 (Lars Blomquist m.fl.), 1 2K ♀ Fröjel 21.5 (Stellan Hedgren, Gun Ingmansson).

Hl: 1 1K Getterön 2.9 (Christer Johansson m.fl.).

Vg: 1 1K Monås, Hjo, 4.9 (Gunnar Jakobsson), 1 1K Hullsjön 15.9 (Göran Darefelt).

Nrk: 1 ♂ Väla, Viby, 4.6 (Tommy Forslund, Sune Björkwi).

(Östra Europa). Största antalet i landet sedan invasionen 1952. Notera de fem ungfågeln i september och de fyra fåglarna på Gotland och Öland i maj. Aprilfyndet på Gotland ligger relativt tidigt, men det tidigaste fyndet i landet gjordes redan 31.3 1972.

Större skrikörn *Aquila clanga* (ca 200 — 5)

Sk: Minst 4 subad./ad. i sydvästra Skåne 24.8—24.10 (Per-Olof Andersson, Jan Hägg m.fl.). Av dessa sågs 3 ex. tidvis på Falsterbohalvön.

Bl: 1 ad. str. Vettekulla, Karlshamn, 2.10 (Thomas Nilsson m.fl.).

Öl: 1 ad. Ottenby 18.9—1.10 (Mats Andersson, Bengt Grandin m.fl.).

P/IpM: 1 ad. Grandal, 8 km nordväst Arvidsjaur, 4—6.12 (Folke Lindgren, Roger Nilsson).

(Europa från Baltikum österut). Ovanligt många fynd för att vara i "modern" tid. Annars har trenden för större skrikörnsfynd varit minskande sedan 1960-talet. Det är oerhört svårt att reda ut hur många individer som varit inblandade, bl.a. beroende på varierande kvalitet på beskrivningarna. Det är till stor hjälp om rapportörer anger vilka ving- och stjärt pennor som saknas på fåglarna. Det ligger nära till hands att anta att Ölands- och Blekingefågeln är identisk med en av de fyra i Skåne. Flera vinterfynd finns sedan tidigare i Norrland. Det

senaste fyndet i Finland är däremot 27.11 (1988).

1987. Upl: 1 subad. Angarn 13.8 (Lars Samuelson). 1987 års summa blir tre.

Mindre skrikörn *Aquila pomarina* (75 — 16)

Sk: 1 ad. Skanörs Ljung 12 och 18.6 (Martin Thysell). På Falsterbohalvön sågs under perioden 8.8—1.10 minst 2 ad., 8 subad. och 4 ad./subad. (Nils Kjellén m.fl.). Summan 14 ex. grundar sig på individer som kunnat särskiljas med hjälp av dräktkaraktärer och luckor i vingarna. Som mest sågs 5 ex. över Ljungen 6.9. Även om få ex. verkligen kunde konstateras sträcka ut sågs de olika individerna ofta inte mer än två olika dagar. Toppen inföll 22.8—18.9, då minst 11 ex. noterades. Dessutom gjordes ett flertal observationer vid sjöarna i sydvästra Skåne, men dessa fynd har inte gått att särskilja från Falsterbofågeln, varför de antagits vara samma.

Bl: 1 ad. Utlängan 17—18.9 (Göran Karlsson).

Öl: 1 ad. Ottenby 10.9 (Björn Andersson m.fl.), 1 IK Ottenby 18.9 (Joakim Johansson m.fl.).

(Östra Europa till centrala Asien). En av årets stora sensationer, årssiffran överträffar alla tidigare år med bred marginal. Även här ligger svårigheter i att bedöma antalet exemplar, och de 14 höstfågeln i Skåne är ett minimiantal. Den adulta fågeln på Öland och i Blekinge har ansetts vara samma som en av Skånes fåglar. 1K-fåglar är mycket sällsynta, och det är förvånande att Ölandsindividerna inte dök upp i Skåne senare.

1976. Nrk: 1 ad. Kvismaren 21.6 (Lage Johnson). 1979. Sk: 1 subad./ad. norr Käseberga 10.9 (Erhard Thieme). Troligen identisk med någon av de övriga fåglarna i Skåne denna höst.

Stäppörn *Aquila rapax* (13 — 4)

Sk: 1 subad. Fyledalen 9.1 (Per Eriksson m.fl.), 1 subad. Falsterbo 29.8 (Anders Jönsson m.fl.), 1 2K Falsterbo 7—9.9 (Magnus Ullman m.fl.).

Gil: 1 trol. 3K Stora Karlsö 15.5 och 24—25.7, Fårö 19—20.5, Gotska Sandön 26.5—2.6, Storsudret 15—21.7 och 5.8—11.9 samt Östergarn 18.9 (Stellan Hedgren m.fl.).

(Asien). Den högsta årssumman hittills. Arten förekommer i fångenskap, se nedan för detaljer om ett äldre icke-spontan fynd. Januari-fågeln sågs även i december 1987.

Kejsarörn *Aquila heliaca* (7 — 1)

Sk: 1 ad. Falsterbo 17—18.9 (Magnus Ullman, Erik Nordström m.fl.).

(Sydvästra och sydöstra Europa samt Asien). Rk anser att de observationer som gjorts under 1980-talet endast gäller tre individer. Årets individ har setts i Falsterbo vid ungefär samma tid tre år i rad.

Dvärgörn *Hieraaetus pennatus* (9 — 1)

Sk: 1 ljus fas Falsterbo 11.10 (Anders Jönsson m.fl.).

(Kontinentala Europa och österut). Det hittills senaste fyndet i landet. Sex av fåglarna har varit av ljus fas.

Eleonorafalk *Falco eleonorae* (2 — 2)

Sk: 1 ljus fas Ljungen, Falsterbo, 4.9 (Roger Ahlman m.fl.).

Öl: 1 ad. ljus fas Stenåsa 29.8 (Staffan Rodebrand).

(Öar i Medelhavet och i Atlanten utanför Marockos kust). Det har visat sig att många rara rovfåglar först dyker upp på Öland, för att någon tid senare visa sig i Skåne innan de lämnar landet. Det är tänkbart att så varit fallet med denna fågel, men å andra sidan är eleonorafalken inte lika bunden av landkänning som andra rovfåglar, och det är lika troligt att det kan röra sig om två olika individer. Fynd har också gjorts i Storbritannien (två fynd, Dymond m.fl. 1989) och Polen (Anonym 1986). De två tidigare svenska fåglarna sågs på Öland och Gotland i juli 1983.

Tjockfot *Burhinus oedicnemus* (19 — 1)

Vstm: 1 ex. Hågernäs, Skinnskatteberg, 15.7 (Grzegorz Mikusiński).

(Kontinentala Europa). Fågeln uppträdde på ett hygge i skogen. Arten är iakttagen under nära nog samtliga årets månader med en topp i juni—augusti.

Svartvingad vadarsvala *Glareola nordmanni* (11 — 0)

1987. Vg: 1 ex. Hornborgasjön 20.6 (Peder Fält). (Sydöstra Europa och Asien). Något fler svartvingade än vanliga vadarsvalor har nu setts i landet.

Sibirisk tundrapipare *Pluvialis fulva* (5 — 0)

1987. Hl: 1 ♀ Getterön 22.7 (Stefan Johansson m.fl.). (Norra Sibirien och västra Alaska). Ytterligare en individ sågs i mellersta Halland vid samma tid.

Obestämd tundrapipare *Pluvialis dominica/fulva* (14* — 1)

Öl: 1 ex. Stenåsa 9.9 (Staffan Rodebrand).

* innefattar även till arten bestämda tundrapipare

Tundrasnäppa *Calidris mauri* (0 — 1)

Sk: 1 ad. Rönnen 19—22.8 (Mats Rellmar m.fl.).

(Nordamerika). Ny art för landet. Snäppan visade upp sig väl för tillresta skådare. Arten är en relativt sällsynt transatlantisk vagrant med bara fem fynd i Storbritannien (Dymond m.fl. 1989) och lockade till och med få-



Klykstjärta
klykstjärta
vationer u

gelskådare
har gjorts

Tuvsnäppa

Öl: 1 ad. C
m.fl.).

Hl: 1 IK

Vb: 1 ex.

(Gustaf

(Nordame

gistreras p

1981. And

vadare. De

östliga och

Prärielöpa

Sk: 1 IK

(Nordame

skånska fy

är typisk.

Obestämd

griseus (19

1986. Jmt:

til Roos 1



Klykstjärtad stormsvala, Getterön 10 okt. 1988. Från och med 1988 skall arten inte rapporteras till Rk — den klykstjärtade (86 ex. 1988) ingår nu i den allmänna fågelrapporten. Av "vanlig" stormsvala gjordes inga fältobservationer under året. Dock ringmärktes 1 ex. (se foto s. 457). Foto: Mikael Nord. *Leach's Petrel*.

gelskådare från kontinenten till Skåne. Ett tidigare fynd har gjorts i Danmark, i maj 1976.

Tuvsnäppa *Calidris melanotos* (48 — 3)

Öl: 1 ad. Ottenby 5.8 (Toni Berglund, Joakim Johansson m.fl.).

Hl: 1 1K Morups tånge 17.8 (Martin Amcoff m.fl.).

Vb: 1 ex. Rotnäsudden, Umeålvens delta, 14—19.5 (Gustaf Egnell, Jörgen Wiklund m.fl.).

(Nordamerika och nordöstra Sibirien). Tuvsnäppan registreras på konstant nivå och har varit årsviss sedan 1981. Andelen vårfynd är relativt hög för att vara en vadare. Det är troligt att vi nås av tuvsnäppor från både östliga och västliga populationer.

Prärielöpare *Tryngites subruficollis* (11 — 1)

Sk: 1 1K Nabben, Falsterbo, 1.10 (Nils Kjellén m.fl.).

(Nordamerika och nordöstra Sibirien). Samtliga tre skånska fynd har gjorts på Falsterbohalvön. Tidpunkten är typisk.

Obestämd beckasinsnäppa *Limnodromus scolopaceus/griseus* (19* — 0)

1986. Jmt: 1 ex. Galhammar, Svenstavik, 11—13.5 (Ber-til Roos m.fl.). (Nordamerika och nordöstra Asien).

Större beckasinsnäppa är anträffad nio gånger, medan mindre beckasinsnäppa ännu inte anträffats hos oss.

* Totalsumman inkluderar även till arten bestämda beckasinsnäppor.

Rödspov *Limosa limosa*

Fågel uppvisande karaktärer för rasen *islandica* (0 — 1):

1987. Hl: 1 ♂ Getterön 31.5—mitten av juni (Mikael Nord m.fl.).

(Island). Första fyndet i landet av denna ras. Endast typiska hanar torde gå att fältbestämma säkert. Häckar på Island, övervintrar på Brittiska öarna och ses under sträcket regelbundet i västra Norge.

Dammsnäppa *Tringa stagnatilis* (59 — 10)

Sk: 1 ex. Hasslarps sockerbruk 14.5 (Mats Rellmar m.fl.), 1 ad. Skanör 8.7 (Bengt Grandin m.fl.).

Bl: 1 ex. Gökalv 1.5 (Jörgen Pisch).

Öl: 1 ex. Segerstad—Sebybadet 21.7 (Lars Rigbäck, Per Svensson).

Hl: 1 ex. Getterön 6—7.5 (Mikael Nord m.fl.).

Ög: 1 ex. Svartåmynningen, Roxen, 13.5 (Berndth Gustafsson m.fl.).

Nrk: 1 ex. Tysslingen 13.5 (Erik Nordberg).

Vstm: 1 ex. Fläcksjön 14.5 (Karl-Gunnar Källebrink, Tommy Lennartsson).